

○ *Potentilla chinensis* SERINGE var. *isomera* FRANCHET & SAVATIER ハ ひろはのかはらさいこデハナイ

原記載 (original description) ト原標本 (type specimen) トハ大抵ノ場合ヨク符合スルモノデアルカラ記載ヲ正確ニ判斷スルト著者が何種ヲ記シテ居ルカラ知り得ルノガ常デアル。私ハ巴里博物館デ日本ヤ朝鮮ノ植物ヲ歐洲ヤ 西比利亞ノ植物ト同定シテアルモノ、アル時常ニ原記載ト原標本トヲ見較ベテ其モトノ性質ヲ頭ニ入レ次ニ日本ヤ朝鮮ノモノガ之ニ全然合致スルカ否カラ見タガ其際ニモ FISCHER, MEYER, TURCZANINOW, LEDEBOUR, BUNGE, HOOKER, TRAUTVETTER, MAXIMOWICZ 等ガ東亞ノ植物ニツイテナシタ原記載ガ正確ナモノデアルコトヲ見タノガ普通デアルガ又往々ドウモ原標本ト記載トガ合致シナイモノガアル、此處ニ記ス所ノかはらさいこノ一變種トシテ書カレタ var. *isomera* モ其一例デアル小泉氏ハ之ヲひろはのかはらさいこト同定シタノミナラズ 萬國植物命名規則ヲ無視シテ 1930 年ニ *Potentilla isomera* KOIDZUMI ナル新組合セヲ作ツテ既存ノ學名 *Potentilla niponica* WOLF (1908 年版) ニ代ヘル様ニシテ發表シタガ此方法ハ 1867 年ニ出版サレタ ALPHONS DE CANDOLLE 案ノ命名規則ニハ適用サレ得ルガ 1905 年以後效力ヲ發生シタ萬國植物命名規則ニハ當テハマラナイ名デアル、言ヒ換ヘレバ變種名ヤ品種名ガ或植物ニ與ヘラレテアツタノガ其植物ニ附ケラレタ 種名ヨリ早クテモ 變種名ヤ品種名ヲ用キテ新ニ種名ヲ作ツテハナラヌノデアル、此規則ハ異名ヲ出來得ル限り殖サナイト云フ意見カラ來テ居ルノデアツテ一寸考ヘルト早ク出テ居タ名ヲ無視スルノハ 不都合極マル事ノ様デハアルガ異名ノ多イノニ惱マサレルヨリハヨイカラ一旦別ニ種名ガツイテ居タ場合ハ其種名ノ方ヲ用キルコトニナツテ居ル。然シ種名ガナカツタ 場合ニハ小泉氏ノナシタ 様ニ變種名ヲ用キテ *Potentilla isomera* ナル種名ヲ作ルノガ當然デアル、最近理學士原寬氏ハ氏ノ南日高植物誌中ニハ小泉氏ノ意見ヲ一部採擇シテ *Potentilla niponica* ひろはのかはらさいこノ正シイ種名トシテ其異名ニ *Potentilla chinensis* var. *isomera* ト *Potentilla isomera* トヲ記シテ居ル。私ノ巴里滞在中ハ 隱花植物研究室デ相當多クノ日子ヲ費シタ爲メ 顯花植物ハ私ノ豫期シテ居タモノ、一部分ヨリ見ル機會ヲ得ナカツタケレドモ *Potentilla chinensis* ノ標本ハ私ガ朝鮮デ新變種ヲ書イテ居タノヲ確メル爲メ 其以前ニ記サレテ 居タ各家ノ變種ヲ一々當ツテ見タノデアリ 現ニ簡單ナガラ當時ノ備忘記モ所持シテ 居ルガ私ノ 見タ結果ニ依ルト 巴里博物館ニアル *Potentilla chinensis* var. *isomera* ノ原標本ト FRANCHET 氏ノ原記載トハ全く合ハズシテ var. *isomera* ハかはらさいこ *Potentilla chinensis* SERINGE 其物デアル。其ノミナラズ var. *isomera* ト同時ニ FRANCHET 氏ガ Enumeratio Plantarum Japonicarum 第 2 卷 338-339 頁ニ記シタ多數ノ變種ヲ點檢シタ所 α. *Micrantha* ハ花ガ末ニナツテ小サイ花丈ケガ残ツテ居ルかはらさいこノ標本デアリ β. *Hirtella* ハ花數ノ稍少イ比較的若イかはらさいこノ個體デアリ γ. *Concolor* ハ標本ガ泥デ汚レテ居テ葉裏ニ密生シテ居ル 白毛ガ汚レテ 葉ノ表裏共ニ同様ノ汚色ヲシテ 居ルかはらさいこノ 悪イ標本デアツテ葉裏ガ綠色デアツタノデハナイ、δ. *Lineariloba* ハ押しシガ足ラヌ爲メ葉ガ捲イテ裂片ガ一寸見ニハ細ク見エルかはらさいこノ作りソコネノ 標本デアリ ε. *Ramosa* ハ var.

Isomera ト共ニかはらさいこ其物デアル。變種名ヲ皆大文字デ記シタノハ FRANCHET ノ書ニアル通りニシタノデアルガ本來ハ當然小文字デ記スベキデアル。(中井猛之進)

○FRANCHET 氏ノ取扱ツタ *Cyperus* ノ數種

FRANCHET & SAVATIER: Enumeratio Plantarum Japonicarum 第 2 卷 100 頁ニ *Cyperus nitens* L. トアルノハ *Juncellus serotinus* C. B. CLARKE みづがやつりデアル。又 101 頁ニアル *Cyperus flavescens* L. トアルノハ *Pycrus globosus* REICHENBACH めあぜがやつりデアル。又 103 頁ニアル *Cyperus japonicus* MIQUEL ハみづがやつりデアリ *Cyperus Iria* L. トアルモノ、中 SAVATIER no. 1374 ハ *Cyperus microiria* STEUDEL きがやつりデアル。104 頁ニアル *Cyperus Kramerii* FRANCHET & SAVATIER ハ *Cyperus amuricus* MAXIMOWICZ ノ基本型即チ *Cyperus amuricus* var. *laxus* (FRANCHET & SAVATIER) NAKAI デアル。105 頁ノ *Cyperus Textori* MIQUEL ハきがやつりデアル。斯様ニ誤ガ多イカラ原標本ニツイテ一々當ツテ見ナイト西人ノ書イタ著書論文ノ記事ハ其儘鵜呑ミニスルノハ危険極マリナイコトデアル。(中井猛之進)

○中肋ノ離脱




Fig. 1. *Codium spiralis* an example of midrib excurrent.

葉ノ中肋ハ通常基部ヨリ尖端部ニ達シ、時ニハ更ニ先端ヨリ突出スルモノデアルコトハ蓋シ常態デアラウ。然シマタ時ニハ葉尖ヨリ約 1 セ、メ程ノ手前デ葉面カラ完全ニ脱離シテ針狀ノ突起然タルコトモアル。其一例トシテ温室育チノ、へんえふぼく一名くるとんイヤぼりねしあ原産ノ *Codium spiralis* (Fig. 1) ヲ擧ゲル事ニスル。(コノ種名ニ就テハ松崎直枝氏ニ負フ處アリ) 此ノ事實ニ就テハ BAILLEY ノ *Encyclopedia Horticulture* p. 818 ニモ圖ガ出テ居テ、中肋ノ脱離外卷スル事ヲ midrib excurrent ト述ベテアル。

之ニ似タ事ガ草木錦葉集卷之四第 22 丁ニ出テ居ル、即からたちばな (*Bladhia punctata* NAKAI)



Fig. 2. "Kumataka" a garden form of *Bladhia punctata* NAKAI in the S6moku-kiny6-shyū published in 1829.