

Simplocos ノ一新種ニ就イテ

森 邦 彦

Kunihiko MORI: A description of *Simplocos taririkensis* sp. nov. from Taiwan.



Fig. 1. *Simplocos taririkensis* MORI.

別サレル。又 *Simplocos ilicifolia* ト比較スルト葉幅ノ狭イコト、第一側脈數ガ著シク少イコト（彼ハ 7-10 對）等ニヨリ判然ト區別スルコトガ出來ル。勿論花序ノ分岐シテアル點ヨリ觀察スル時ハ之等兩者ト全然異ナルヲ知ル。種名ハ產地名ノ タリリク社（蕃社名）ニ因ンデ *Simplocos taririkensis* ト命名シタ。終リニ山本由松先生ノ御教示ニ對シ感謝ノ意ヲ表スル。

***Simplocos taririkensis* MORI, sp. nov.**

Rami subteretes glabri, cortice nigrescenti, ramulis gracilibus glabris fusco-

臺灣産ノはひのき科植物ヲソノ花序ニヨリ分類シテミルト次ノ四ツニナル。

1. 穗狀花序ヲナスモノ。
2. 集團花序ヲナスモノ。
3. 總狀花序ヲナスモノ。
4. 複穗狀花序ヲナスモノ。

以上ノ内穗狀花序ヲ呈スルモノハ更ニ次ノ二ツニ區別スル事ガ出來ル。即チ

- a. 單穗狀花序。
- b. 複穗狀花序（分岐スルモノ）。

本種ハ b = 屬シテ居ル。葉ハ一見 *Simplocos arisanensis* ニ似テアルガ全然無毛ナルコト、葉柄ノ著シク長イコト、第一側脈數ノ少イコト（彼ハ 6-8 對）等ニヨリ明ラカニ區別

flavescentibus. Folia coriacea, oblonga, 6.5-8.5 em longa, 2.0-2.5 em lata, apice acuminata vel caudato-acuta raro acuta, basi cuneata, margine remote crenata, utrinque glabra, costis supra tenuiter impressis, subtus elevatis, venis utraque pagine plus minus elevatis, venis lateralibus primariis utroque latere costæ 4-5 ad medium angulis 40°-50° a costa egressis, petiolis 0.8-1.3 em longis glabris. Spicæ fructiferæ terminales vel avillares, a basi pauci-ramosæ. Fructus globosus vel ureolatus, glaber, circ. 4 mm longus et latus, apice calycibus corniculatis persistentibus coronatus, lobis 5 glabris late triangularibus circ. 1 mm longis apice rotundatis, basi bracteatus, et bracteolatus, bracteis et bracteolis hirsutis, 3-ocularis; semina oblonga.

Nom. Jap. *Taririku-hainoki*.

Hab. Taririkusha,

Pref. Taitô (leg. S. SASAKI, Mai. 1924, Typus in Herb. Imp. Univ. Taihoku).




Fig. 2. a. 果實ヲ有スル枝(實物大) b. 果實(2×) c. 果實横斷面(擴大) d. 果實縱斷面(擴大)

雜 錄 Miscellaneous

○どうだんつつじ {*Enkianthus perulatus* (MIQUEL) SCHNEIDER} ハ伊豆ニモ自生スル (T. NAKAI: The wild growth of *Enkianthus perulatus* in the Province of Idzu.)

大正2(1913)年2月發行ノ植物學雜誌即チ第27卷314號ニ筆者ハ「疑問ノどうだんつつじ」ト題シテどうだんつつじノ自生ガ日本内地ニアルコトガ疑ハシイ様ニ記イタ。當時ハ