

1 pl.—PENZIG, Pflanzen-Teratologie. Berlin. 2 Aufl. (1921-'23)—PERSONNAT, Bull. de la Soc. Bot. de Fr., 5 (1858), p. 594 sqq.—RALEIGH, Gardner's Monthly Advertiser, p. 246 (1878),—RUSSELL, Rev. Gén. de Bot., 3 (1891), pp. 33-42; ibid., pp. 337-340.—SCHIMPEE, Flora, 37 (1854).—SCHLECHTENDAL, Bot. Zeitg, 19 (1861), p. 4.—SCHULTZ, in Engl. Pflanzenreich, IV-105 (70. Heft) (1919); in Engl.-Prantl Nat. Pfl.-fam. 2. Aufl. Bd. 17-b. (1936)—SMITH, Gard. Chron. 1880—SIDEY, Gard. Chron. 1882-II, p. 152; Proc. Edinb. Bot. Soc. 14-3 (1883), 118.—TAYLOR, Bot. Gaz. 1 (1849).—WARMAN, Gard. Chron., 1888, p. 463.—WORS-DELL, Principles of Plant Teratology, London, Vol. 1 (1915), 2 (1916).

最後=本科=於ケル他ノ種類ノ附屬葉片・盃狀體・盃狀葉等ノ出現セル例ヲ見ルニ、SAUTER¹⁾ハ *Arabis pumila* WULF ノ葉表=附屬葉片及ビ盃狀體ノ生ズルヲ報告シ、DE VRIES²⁾ハ *Barbarea vulgaris* R. BR. =盃狀體ヲ (p. 179), *Hesperis matronalis* L. =上面盃狀葉ヲ觀 (p. 165, p. 193)、後者ハ遺傳スルヲ認メ、又 BEYER³⁾ハ *Raphanus sativus* L. =上面盃狀葉ヲ觀察シテキル。

學 名 餘 談 (其三)

原 寬

H. HARA: Miscellaneous Notes on the Nomenclature of Asiatic Plants (III)

12) いぬびゆ 本種ノ學名ニハ色々ノ意見ガアリ非常ニ複雑デアルガ、MERRILL 氏ハ American Journal of Botany 23, p. 609 (1936) =彼ノ見解ヲ發表シテ居テ私モソレニ賛成スル。彼ニヨルト *Amaranthus viridis* L. ハ次ノ要素カラ成ル。

| | | | |
|--|---|---|------|
| <i>Amaranthus viridis</i> L. Sp. Pl. ed. 2. | } | 原記載 (コレハ L 氏ガ新シク標本ニ基イテ書イタモノデア ル) | あをびゆ |
| | | Syn. <i>Blitum album minus</i> BAUH. | いぬびゆ |
| | | <i>Blitum minus album polyspermum folio subrotundo</i> SLOAN. (圖アリ) | あをびゆ |
| | | <i>Blitum sylvestre spicatum</i> TOURNEF. | いぬびゆ |
| | | <i>Caruru</i> PIS. (圖アリ) | あをびゆ |
| | | 原記載=符合スル L. 氏所有ノ標本 | あをびゆ |

¹⁾ Flora, 24 (1841), p. 380. ²⁾ Bot. Jaarb. Dodonea, 7 (1895), pp. 129-197, Taf. III-V. ³⁾ Sitzb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, 1877, pp. 92-93.

故 = *A. viridis* L. ハ、原記載、原標本及ビ圖ノアル引用文獻即チ SLOANE ト PISO ノモノガあをびゆ（ほながあをびゆ）(*Euxolus caudatus* MOQUIN) デアルカラあをびゆ = 用フベキデアツテ、例ヘ引用文獻中ノ最初ノモノ即チ BAUHIN ノモノガいぬびゆデモいぬびゆ = 用フルノハ不當デアリ、又 nomina confusa トシテ捨テル必要モナイ。而シテいぬびゆハ、*A. lividus* L. ヤ *A. oleraceus* L. カラ種トシテ區別スベキカ否カハ問題デアルガ、一先ヅ *A. ascendens* LOISEL. ヲ用ヒレバヨイトイフノデアル。私モコレ = 同意スルガ、*Euxolus* 屬ハ *Amaranthus* カラ分ケタ方ガヨイト考ヘルカラ、次ノ如キ組合セテ作ル事ニスル。尙 *A. Blitum* L. トイフモノモ THELLUNG (in ASCHERS. et GRAEBN. Syn. Mitt-europ. Fl. V, p. 299) = ヨルトいぬびゆ = ハ用ヒラレナイ。*A. Blitum* L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) ハ、L. 氏ガ彼ノ Hortus Cliffortianus (1737) デ別 = 扱ツテキタ ‘*A. capitulis ovato-oblongis lateralibus, foliis ovatis, caule erecto*’ (コレハ *A. angustifolius* subsp. *silvester* THELLUNG = *A. sylvestris* DESF.) ト ‘*A. foliis ovatis emarginatis*’ (コレハいぬびゆ) ヲ一緒ニシテ作ツタ名デアル。*A. Blitum* ノ記文 = ‘*foliis ovatis retusis*’ トアルノハ *A. sylvestris* ノ尖ツタ葉トいぬびゆノ凹頭ノ葉トノ混合デ、次頁 = デテキル *A. retroflexus* ノ記載中デハ ‘*Folia ovata, acuta A. Bliti.*’ ト尖ツテキル如ク書イテアル。又 L. 氏ノ Herb. 中ノ標本モ尖ツタ葉ヲ持ツタ *A. sylvestris* デアル。後 = L. 氏ハ Sp. Pl. ed. 2, II (1763) デ再ビコノ二者ヲ分ケ *A. Blitum* ノ syn. 中ヘ明カ = *A. sylvestris* デアル *A. sylvestris* & *vulgaris* TOURNEF. ヲ加ヘ、いぬびゆデアル *Blitum album minus* BAUH. ヲ syn. ヨリ除キ前記ノ如ク *A. viridis* = 入レタ。以上ノ如ク *A. Blitum* L. ハ Sp. Pl. ed. 1 ノ syn. ヲミルトいぬびゆノ様デアルガ、ソノ前後ノ關係ヤ L. 氏ノ原標本ハ *A. sylvestris* デアルトイフカラいぬびゆ = 用ヒルノハヨクナイ。一方あをびゆノ學名ハ *Euxolus viridis* (L.) MOQUIN トスベキデ、松村先生ガあをびゆノ和名ヲツケラレタ時ノ學名ガ正シイ事ニナリ、ソノ和名ノ意味モ推察デキル。

***Euxolus ascendens* (LOISELEUR) HARA, comb. nov.**

Syn. *Amaranthus Blitum* LINNÆUS, Sp. Pl. ed. 1, II, p. 990 (1753) tantum quoad syn.

Amaranthus viridis LINNÆUS, Sp. Pl. ed. 2, II, p. 1405 (1763) quoad syn. BAUHIN et TOURNEFORT.

Amaranthus ascendens LOISELEUR, Not. Pl. France p. 141 (1810)—SCHINZ et THELLUNG in Bull. Herb, Boiss. ser.-2, VII, p. 178(1907).—MERRILL

in Amer. Journ. Bot. 23, p. 611 (1936).

Euxolus viridis MOQUIN in DC., Prodr. XIII-2, p. 273 (1849) quoad descrip. excl. syn. *A. viridis* L.

Euxolus viridis β . *ascendens* MOQUIN., l. c. p. 274 (1849).

Euxolus blitum GRENIER, Fl. Jurass. p. 652 (1865).

Amaranthus lividus L. II. *ascendens* THELLUNG in ASCHERSON et GRÆBNER, Syn. Mitteleur. Fl. V, p. 322 (1914).

13) からふとだいこんさう (ひろはだいこんさう) 本種ノ學名ハ *Geum Fauriei* LÉVEILLÉ ガ正シイ。

***Geum Fauriei* LÉVEILLÉ** in FEDDE, Rep. Sp. Nov. VIII, p. 281 (1910).

Syn. *Geum japonicum* var. *sachalinensis* KOIDZUMI in Bot. Mag. Tokyo XXIX, p. 157 (1915).

Geum japonicum var. *Fauriei* KUDO, Rep. Veg. N. Saghal. p. 165 (1924).

Geum sachalinensis (non LÉVEILLÉ 1910) MAKINO in Journ. Jap. Bot. III-7, p. 28 (1926).

14) ねぢぎ *Lyonia* NUTTALL ガ保留名トナリ、*Xolisma* ガ捨テラレタノデ、本種モ *Lyonia* = 移サネバナラナイ。併シ *Lyonia elliptica* C. WRIGHT ノ名ガキューバ産ノモノニ用ヒラレタノデ新名ヲ選ンダ。尙 *L. ovalifolia* (WALLICH) DRUDE ハ葉裏ニ褐色ノ臥毛ヲ有スルノデねぢぎト區別スベキデアル。

***Lyonia Neziki* NAKAI et HARA**, nom. nov.

Syn. *Andromeda elliptica* SIEBOLD et ZUCCARINI in Abh. Acad. Wiss. Muenchen IV-3, p. 126 (1846).

Pieris ovalifolia var. *elliptica* REHDER et WILSON in SARGENT, Pl. Wilson, I. p. 552 (1913).

Pieris elliptica NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXIII, p. 207 (1919).

Xolisma ovalifolia var. *elliptica* REHDER in Journ. Arnold Arb. V, p. 52 (1924).

Xolisma elliptica NAKAI, Trees & Shrubs Jap. ed. rev. I, p. 204 (1927).

Lyonia ovalifolia var. *elliptica* HAND.-MAZZETTI, Symb. Sin. VII-4, p.

788 (1936).

15) **おにく** *Boschniakia rossica* (CHAMISSO et SCHLECHT.) ノ組合セハ、HULTÉN ヨリ 20 年モ前ニ FEDTSCHENKO ガ作ツテキルノデソレヲ用ヒネバナヲナイ。

Boschniakia rossica FEDTSCHENKO in FEDTSCHENKO et FLEROV, Fl. Europ. Ross. p. 896 (1910); in Acta Hort. Petrop. XXXI, p. 178 (1912).

Syn. *Orobanche rossica* CHAMISSO et SCHLECHTENDAL in Linnaea III, p. 132 (1828).

Boschniakia glabra C.A. MEYER ex BONGARD in Mém. Acad. St.-Pétersb. ser. 6, II. p. 157 (1833)—G. BECK in ENGLER, Pfl.-reich IV-261, p. 327 (1930).

Boschniakia rossica HULTÉN, Fl. Kamt. IV, p. 126 (1930)—NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLVI, p. 66 (1932).

16) **きつねあざみ** 我國デハ 牧野先生以來 *Hemistephta carthamoides* O. KUNTZE ガヨク用ヒラレルガ、ソノ組合セノ基トナル *Serratula carthamoides* HAMILTON ex ROXBURG ヤ *Cnicus carthamoides* WALLICH ハ、同名ガソレ以前ニ *Centaurea carthamoides* BENTH. et HOOH. f. = 用ヒラレタカラ無効デア。最モ古イ有效名ハ *H. lyrata* BUNGE デアル。

Hemistephta lyrata BUNGE in Dorp. Jahrb. Litt. I, p. 222 (1833).

Syn. *Serratula carthamoides* (non POIRET 1804) BUCH-HAMILTON ex ROXBURG, Hort. Bengal. p. 60 (1814) nom. nud.; Fl. Ind. III, p. 407 (1832).

Cnicus carthamoides (non WILLDENOW 1800) WALLICH, Cat. no. 2896(1829) nom. nud.

Serratula multicaulis WALLICH, l.c. no. 2897 (1829) nom. nud.

Cirsium lyratum BUNGE. Enum. Pl. Chin. Bor. p. 36 (1833).

Aplotaxis carthamoides A. P. DE CANDOLLE, Prodr. VI, p. 540 (1837).

Aplotaxis multicaulis DC., l.c. (1837).

Aplotaxis Bungei DC., l.c. p. 539 (1837) nom. non legitim.

Saussurea affinis SPRENGEL ex DC., l.c. (1837) pro syn.—CLARKE, Comp. Ind. p. 232 (1876).

Hemistephta carthamoides O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. I, p. 344 (1894)—KITAMURA, Comp. Jap. I, p. 138 (1937).

17) **まるほはりみ** *Eleocharis ovata* 又ハ *Heleocharis ovata* トイハレテキルガ、コノ名ノ基ニナル *Scirpus ovatus* ROTH ハ一年前ニ GILBERT ノ同名ガアルノデ有效デナイ。次ニ *S. compressus* MOENCH ハ *Scirpus* デハヨイガ、*E. compressa* SULLIVANT (1842) ノ名ガアルノデ *Heleocharis* ヘ組合セハ作レナイ。故ニ正名ハ *H. soloniensis* (DUBOIS) HARA デアル。又我國ノモノハ歐洲産ニ比シ鬚體ガ長ク瘦果ノ倍長モアルカラ、歐洲産ノ變種トスベキデアルト考ヘル。尙 R. BROWN ハ *E. ovata* ノ組合セハ作ツテキナイ。

Heleocharis soloniensis (DUBOIS) HARA, comb. nov.

Syn. *Scirpus ovatus* (non GILBERT 1792) ROTH, Tent. Fl. Germ. III, p. 562 (1793)—ASCHERSON et GRÆBNER, Synop. Mitteleur. Fl. II-2, p. 292 (1904).

Scirpus compressus MOENCH, Meth. p. 349 (1794).

Scirpus annuus (non ALLIONI 1785) THUILLIER, Fl. Paris. ed. 2, p. 22 (1799).

Scirpus soloniensis DUBOIS, Méth. Orléan. p. 295 (1803).

Eleocharis ovata ROEMER et SCHULTES, Syst. Veg. II, p. 152 (1817)—SVENSON in Rhodora 31, p. 211 (1929)—ZINSERLING in Fl. URSS. III, p. 71 (1935).

var. **nipponica** HARA, var. nov.

Syn. *Eleocharis ovata* (non ROEMER et SCHULTES) MIYABE et KUDO, Fl. Hokk. & Saghal. II, p. 207 (1931)—HARA in Journ. Jap. Bot. X, p. 524 (1934)—OKUYAMA in Journ. Jap. Bot. XII, p. 189 (1936).

Heleocharis ovata var. *nipponica* HARA, mss.

Setæ hypogenes 1.9—2.2 mm longæ achenio duplo longiores.

Typus. Honshu. prov Suruga : Kawaguchiko (B. HAYATA—Aug. 6, 1924).

In the typical form of Europe, setæ are usually 1.4—1.8 mm long.

18) **うしくぐ** *Cyperus truncatus* TURCZANINOW ノ名デ廣ク知ラレテキルガ、コノ名ガ最初ニ出タ Cat. Pl. Baie Dah. (1838) ハ名ノミデ、記載ガツイテ有效ニナツタノハ LEDEBOUR, Fl. Ross. IV, p. 241 (1853) デアル。然ルニコレヨリ 2 年前 1851 年ニ *C. truncatus* RICHARD ノ名ガ他ノ種ニ用ヒラレタノデ、*C. truncatus* TURCZ. ノ名ハ残念ナガラ失格スル。ソレデこうしくぐニツケラレタ *C. orthostachyus* FRANCH. et SAV. ヲ活用シ、うしくぐヲ逆ニソノ變種トシテ新組合セラ作ル事ニシタ。

Cyperus orthostachyus FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, p. 106 (1876) nom. nud. & p. 539 (1877).

Syn. *Cyperus truncatus* var. *orthostachyus* CLARKE in Journ. Linn. Soc. XXXVI, p. 218 (1903)—NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLVII, p. 241 (1933)—KÜKENTHAL in ENGLER, Pfl.-reich IV-20, Heft. 101, p. 155 (1935).

Nom. Jap. *Ko-ushikugu*.

var. **robustus** (NAKAI) HARA, comb. nov.

Syn. *Cyperus truncatus* var. *robustus* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XL, p. 146 (1926) nom. seminud.—MIYABE et KUDO, Fl. Hokk. & Saghal. II. p. 196 (1931) nom. nud.—NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLVII, p. 240 (1933).

Nom. Jap. *Ushikugu*.

var. **dahurica** HARA, nom. nov.

Syn. *Cyperus truncatus* TURCZANINOW [Cat. Pl. Baic.-Dah. no. 1206 (1838) nom. nud; non A. RICHARD 1851] ex LEDEBOUR, Fl. Ross. IV, p. 241 (1853)—TURCZANINOW, in Bull. Soc. Naturalist. Moscow XXVIII pt. 2, p. 310, no. 1202 (1855)—NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLVII, p. 239 (1933) (var. *typicus* NAKAI)—SCHISCHKIN in Fl. URSS. III, p. 18 (1935)—KÜKENTHAL in ENGLER, Pfl.-reich IV-20, p. 153 (1935).

Nom. Jap. *Hime-ushikugu*.

19) ひめくぐ *Kyllinga brevifolia* ROTTBÖLL デアルガ、我國ノモノハ穎ノ中肋ガ略平滑デ先端ノ突起ガ短カイ。基本形ノモノハ穎ノ背稜ニ小刺ガアリ、先端ハ曲ツタ針狀ノ突起ヲナシ、我國南部ニモ産スル。コノ兩者ノ間ニハ中間形モ見ラレルガ變種位ニシテオイトヨササウデアル。KÜKENTHALハ var. *gracillima* (MIQ.) トシテキルガ、變種名トシテハ *K. monocephala* var. *leiolepis* FRANCH. et SAV. ヲ取ツテ組合セラ作ルベキデアル。尙 CLARKE ニヨレバ *Schaenus coloratus* L. ノ基準標本ハひめくぐデアルトイフガ、一般ニハアメリカノ *Dichromena colorata* (L.) HITCHCOCK トサレテキル。若シ CLARKE ノイフ事ガ實證サレレバ、ひめくぐノ學名ハ *Kyllinga colorata* DRUCE var. *leiolepis* (FRANCH. et SAV.) ト改メネバナラナイ。

Kyllinga brevifolia ROTTBÖLL, Descrip. et Icon. Pl. p. 13, t. 4, f. 3(1773).
Syn. *Cyperus brevifolius* HASSKARL. Cat. Hort. Bogor. p. 24 (1844)—KÜKENTHAL in ENGLER, Pfl.-reich IV-20, p. 600 (1936).

Nom. Jap. *Taiwan-himekugu* (nov.).

var. **leiolepis** (FRANCHET et SAVATIER) HARA, comb. nov.

Syn. *Kyllinga gracillima* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. II, p. 142 (1866).

Kyllinga monocephala var. *leiolepis* FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, p. 108 (1876).

Kyllinga brevifolia var. *gracillima* KÜKENTHAL in Acta Hort. Gotob. V, p. 107 (1929).

Cyperus brevifolius var. *gracillimus* KÜKENTHAL in ENGLER, Pfl.-reich IV-20, p. 603 (1936).

Nom. Jap. *Hime-kugu*.

日本産植物雜記 (其四)

奥山春季

S. OKUYAMA: Miscellaneous Notes on the Japanese Plants (IV)

24) ひろはのはねがや *Stipa japonica* HACKEL ex NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXIV. p. 37 et p. 38 (1920) eum descript.—HONDA, Monogr. Poac. Jap. p. 213 (1930) et in Bot. Mag. Tokyo L. p. 291 (1936) = *Asprella japonica* (non HACKEL) MAKINO & NEMOTO, Cat. Herb. Nat. Hist. Dept. Tokyo Imp. Mus. p. 375 (1914).

4-5 年前ノ事デアル。いはたけさうノ名デ入ツテ居ル博物館ノ標本(相模・備後・筑後・豊前・肥後・日向)ガ *Stipa* 屬ノひろはのはねがやナノデオカシナ事モアルモノダト當時久内清孝氏ニ御話シタ事ガアツタ。其折“事實サウ呼ンデ居タ時代ガアル。自分ハ曾テ *Asprella japonica* HACKEL ノ名デ北米ノ HITCHCOCK = 標本ヲ送ツタ所 *Asprella* 屬ノモノデハナイ *Stipa* 屬ノモノダト突込マレタ事ガアル”ト意外ナ又頗ル興味アル経緯ヲ伺ヒラベルノ書キ違ヒヤ何カデハナク上述ノ様ナ理由ニ原因スルモノデアル事ヲ知り得タノデアツタ。之レハ一部學者ノ考ヘ違ヒニ由來スルモノノ様デアルカラ文献ノ上デハ混亂シテ居ナイガ地方植物誌類ニハソレラシイモノヲ見受ケル。最近ヤハリいはたけさうトシタひろはのはねがやノ標本ガ入ツテ來タガ現在モ尙此ノ名ガ廣マツテ居ルノデハナカラウカトノ老婆心カラ此處ニ記録シテ置ク次第デアル。

學名ハ例ノ本田博士ト 耿氏トノ 見解ノ相違 (?) デムヅカシイモノデアルガ