

雜 錄 Miscellaneous

○臺灣ノ *Euphorbia*

Arnold Arboretum デ全世界ノ *Euphorbia* ラ専門ニ研究シテキル Dr. LEON CROIZAT ハ、“A misinterpreted Formosans species, *Euphorbia calonesiaca*, spec. nov.”ト題スル一文ヲ Journal of the Arnold Arboretum XIX p. 97 (1938)ニ發表シテキル。コレハ故早田先生ガ“Revisio Euphorbiac. et Buxac. Jap. p. 70 (1904)”デ *Euphorbia orientalis* L. ヲ臺灣ノ floraニ加ハラレテカラ今日マデコノ名ガ用ヒラレテキル事ニ基因シテキル。CROIZAT ハ *E. orientalis* ハ臺灣ニアリ得ナイト前提シテ、*E. orientalis* L. ハアルメリアト北ペルシヤニ産シ、北アフリカノ *E. bupleuroides* ト中部地中海地方ノ *E. Bivonae* ノ中間ノ性質ヲ有シ、コノ近似品ハ *E. prolifera* ト *E. himalayensis* ノ二種ノミガ雲南ニ達シテキル外、ソレ以東カラハ一ノ報告モナイト述ベテキル。彼ハ HANDEL-MAZZETTI ガ *E. tarokoensis* ガ *E. prolifera* ニ近イ事ヲ述ベテキルノヲ見落シタラシイ。歐洲デモ *E. orientalis* ヲ BOISSIER 以外ノ者ハ南イタリニ特産ノ *E. ceratocarpa* ト屢々混同シテキルガ、彼ハ LINNÉ ノ type ノ寫眞等ヨリ判斷シテ兩者ガ異ナル事ヲ明カニシタ。カクシテ彼ハ *E. orientalis* ガ臺灣ノモノト異ナルノヲ知ツテ、永ラク臺灣ノ標本ヲ得ヨウト努メタガ、最近 Gray Herbarium 中ノ FAURIE ノ (Formosa No. 220, Takao 1914)ガ早田氏ノ記載ニヨク一致スルノヲ知ツタ。彼ハ Takao ハ早田氏ノ Taichu ノ單ニ orthographic variant デアラウトイツテキルガコレハ一寸ヒドカツタ。次ニ臺灣ノ *E. orientalis* ハ勿論 LINNÉ ノモノト異ナリ、いはだいげきヤたかとうだいニ近縁ノモノデ獨立種ト考ヘルト結論シ、*Euphorbia calonesiaca* ノ新名ヲ與ヘテキル。コノ種名ハポルトガルノ發見者ノ ‘Ilha Formosa’ カラ導イタト。

Dr. CROIZAT ハ最近 Flora Hawaiensisニ於テ、*Chamaesyce* (にしきさう屬)ハ *Euphorbia* カラ獨立ノ屬トシテ分離スベキデアル事ヲ詳細ニ説明シ、私ガ本誌 11 卷 382 頁ニ述ベタ特徴ニ更ニ一ツノ重要ナ形態上ノ性質ヲ擧ゲテキル。ソレハ *Chamaesyce* デハ常ニ莖ノ最初ノ主軸ガ必ず最初ノ一對ノ葉ノ上デ止マリ、側枝ガ sympodialニ發育スル事デアル。彼ハ種子ヲ蒔イテコノ事實ヲ確認シテキル。

又彼ハ私ヘノ手紙ノ中デ *Galarhoeus* (たかとうだい屬)モ獨立ノ屬トシテ認メテヨイト考ヘルガ、*Euphorbia* ハ非常ニ複雑ナ屬デアルカラ全世界ノ種ヲ全部調べテカラ後ニ屬ノ分割ニ關スル自分ノ意見ヲ決定シタイシ、ソレニハ相當ノ時日ヲ要スルカラ *E. calonesiaca* ノ如キモ私ニ *Galarhoeus*ヘ移シテ貰ツテ差支ヘナイトイツテキテキル。臺灣・琉球ノ種類ハ今後支那・フィリッピン等ノ種類トノ關係ガ明カナレバ學名ニ多少ノ變更ヲ要スルモノガデテクルト思フガ、今迄知ラレテキルモノノ中 *Chamaesyce*ニ入ルベキモノハ、

C. Atoto (FORST. f.) CROIZAT はまだいげき

C. garanbiensis (HAYATA) HARA がらんびにしきさう

C. liukiensis (HAYATA) HARA りうきうだいげき

C. Makinoi (HAYATA) HARA こばのにしきさう

C. parannaquensis (BLANCO) HARA [*E. serrulata* (non THUILL. 1799) REINW.]

みやこじまにしきさう

C. Tashiroi (HAYATA) HARA のこばにしきさう (けこばのにしきさう)

C. thymifolia (L.) MILLSPAUGH (*C. mauritiana* COMMERS.) いろおもてにしきさう

又小笠原島デハしまにしきさうノ無毛品 *C. pilulifera* var. *glaberrima* HARA (*E. hirta* var. *glaberrima* KOIDZ.) ガ知ラレテキル。

Galarhoeus = 入ルベキモノハ

G. calonesiaca (CROIZAT) HARA たいわんたかとうだい

G. formosana (HAYATA) HARA きだちだいげき

G. Peplus (L.) HAWORTH きだちにしきさう、ちやばだいげき

G. tarokoensis (HAYATA) HARA [?= *G. prolifera* (HAM.)] たろこたかとうだい

尙 *G. Esula* (L.) ノ組合セハ前川文夫氏ノ御注意ニヨリ RYDBERG ガ *Brittonia* I, p. 93 (1931) = 作ツテキルノヲ知ツタ。私ハ今迄ノ *Euphorbia* L. トイフ非常ニ多数ナ種ヲ含ミ、シカモ變化ニ富ンダ屬ノ新分類ガ CROIZAT ニヨツテ一日モ早く確立サレル事ヲ希望スル。
(原 寛)

○ふらさばさう水戸ニ現ハル

Veronica hederæfolia L. ナルいぬのふぐり屬ノ一品ガ確カニ本邦内ニ於テ採集サレ、而モソレガ頗ル興味アル經緯ヲ持ツテ居ルモノデアル事ヲ本誌第十三卷十二號ニ報告シテ置イタ。ソシテ本種ノ再出現ヲ待望シテ居タ所デアツタガ、去ル2月13日茨城縣女子師範ノ鶴町猷氏ガ東京科學博物館へ來館サレテ示サレタ所ノいぬのふぐり屬ノ一品ハ正シク *V. hederæfolia* L. デ、日本ノ何處カニ生殘ツテ居ルデアラウト豫測シテハ居タ事ナガラ、九州ノ涯カラ遙カニ飛ンダ水戸ニ於テ昭和7年5月15日(水戸市外縁岡村)採集サレテ居タノダカラ愉快ナ事デ、實ニ田代氏ノ長崎ニ於ケル採集後20餘年ヲ經過シテ居ル事ニナル。斯クシテ本種ヲ歸化品ナリト斷定スル事ニ何ノ躊躇ノ必要モナクナツタ。而モ水戸ニ於ケル發見ハ益々本邦各地ニ期待出來ル可能性ヲ増加シタ事ニナル。以上一言喜ビノ報告マデ。ナホ其後ふらさばさうハ長崎駐在英國領事 F. C. GREATREX 氏ヨリ東大原寛氏ヘノ通信 “*Veronica hederæfolia*, young plants which I notice the farmers are finding troublesome, as they weed it out in large quantities.” = ヨレバ長崎ニハ今尙多量ニ産シ百姓ヲ困ラセル厄介千萬ナル雜草ノ由デアル。
(奥山 春季)

○あぶらちやんノ稚苗ニ現レタ三裂葉

中井博士ガ滯歐中 Bull. Soc. Bot. France XXIV (1924) p. 1177-82 デ “*Parabenzoïn*, genus novum Lauracearum” ナル一文ヲ草サレ *Parabezoïn* NAKAI ナル一新屬ヲ設ケ、