

(6) *pilosus, pilose, hairy, behaart, poilu*, 有毛ノ、疎長毛アル。(コレハ字ヲ見テモ判ルヤウニ = *glaber, smooth, kahl, unbehaart, glabre*, 無毛ノ、ニ對スル語デアアル。然シソレト同時ニドonna毛カトイフト、軟カク長ク疎ノ毛ヲイフ。即チ廣義ト狹義トノ *pilosus* ガアル。コノ語ヲ *glaber* = 對スルモノトシテドノヤウナ毛ニデモ用ヒ別ニ狹義ノモノニ他ノ語ヲ探シタガ適當ナモノガナイ故狹義ニ此處ニ用ヒテオイタ)。

(7) *velutinus, velvety, samtartig, samtig, velouté*, (ビロードヲ考ヘレバヨイ、立ツテキル毛ニ用フ)。

sericeus, sericeous, seidig, seidenhaarig, 絹毛アル (絹ヲ思ヒ出セバヨイ *velutinus* ヨリモツト細イ。通常臥シタ毛デアアル)。

holosericeus, dichtseidenhaarig, ビロード狀短毛アル (*velutinus* = 殆ド同ジ)。

(8) *pubescens, pubens, downy, flaumhaarig, feinhaarig, weichhaarig, pubescent*, 細軟毛アル。

以上ノモノノ形容詞ニハ指小辭 (*deminutivus*) ノモノアリ。例ヘバ *pilosus* = *pilosiusculus*, *tomentosus* = *tomentellus* アリ *hirtus* = *hirtellus* ガアルガソレハモトノ形ヨリ硬長密ノ度ノ少ナイモノデアツテ最モ關係スルノハ長短デアラウ。

〇けくりんゆきふで (檜山庫三)

くりんゆきふでデ、葉裏ニ毛ノアルモノガアル。余ノ知ル範圍デハ秩父ノ雲取山ト甲斐ノ三ツ峠ニ産スルガ、餘リ顯著ナ毛デモナイカラ、地方デハ無毛品ト混同シテキル恐レガアル。濟州島カラ記載サレタ *Polygonum Marretii* LÉV. ハ囊ニ中井博士ニヨリくりんゆきふでト同定サレタガ、本種ハ無毛且赤脈ノ葉ヲ有スル品デ、本州産ニモ主脈ノ赤イモノガアル。

Bistorta suffulta GREENE; GROSS in Bull. Acad. Geogr. Bot. XXIII. 15 (1913); NAKAI, Veget. Isl. Quelpaert. 400 (1914), & in "Rigakukai" XXIV. 295 (1926); NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. 167 (1936); HONDA, Nom. Pl. Jap. 69 (1939).

Polygonum suffultum MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XXII. 233 (1877); MAKINO, Illust. Fl. Nipp. 629, f. 1886 (1940).

Polygonum Marretii LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. VIII. 171 (1910), fide NAKAI. forma *pubescens* HIYAMA, nov. f.

Folia radicalia et caulina subtus ad venas parce pubescentia supra glabra sed juventute circa marginem minutissime puberula. Cetera ut typica.

Nom. Jap. *Ke-kurin-yukihude* (nom. nov.).

Hab. in Honsyu: Prov. Kai, in Mt. Mitutōge. (K. HIYAMA, June 10, 1934—Herb. Tokyo Sci. Mus.) Prov. Musasi, in Mt. Kumotori. (K. HIYAMA, July 15, 1935). (Kōzō HIYAMA)