

○淡黄あつもりさう (檜山庫三)

通常美シイ紫紅色ノ花ノ咲くあつもりさう＝稀＝淡黄花品ガアル。花蓋ノ脈マデ凡テ淡黄デアツテ、甲斐三ツ峠ノ産デアル。生育地＝於テハ紫紅花品トノ間＝色ノ連絡ヲ認メラレルガ、白花あつもりさうトノ間ニハ、コノ連絡ガ未ダ認メラヌ様デアル。餘事ナガラコノしろばなあつもりさう＝紛ハシイ名＝しろばなあつもりガアル。後者ハ *Cypripedium guttatum* (var. *koreanum*) デ全然別者デアル。帝國大學植物園目錄(1887)＝アルしろばなあつもりさうハ何種ヲ指スモノカ筆者ニハ不明。

ほていあつもり＝モ淡黄花品 (*C. rebunense* KUDO) ガアルガ、花色ハ恐ラクあつもりさうノ淡黄花品ト同様デハナイカト思ハレルフシガアル。又中井博士ノオ説デハ大陸ノ *Cypripedium manchuricum* STAFF ハあつもりさうノ縁花品ノ由デアルガ、ソノ緑色ノ程度如何ニヨツテハ、ココニ云フうすきあつもりさう＝餘程類似シテ來ルモノト思ハレル。あつもりさうノ學名＝最近中井博士ハ *Cypripedium Thunbergii* BL. ヲ採用ザレタ。コノ古イ名ガアル＝モ拘ラズ、ROLFE ガ *C. speciosum* ヲ書イテ以來、多クノ人ガ ROLFE ノ名ヲ採用シタト云フノモ、*C. Thunbergii* ノ正體ガ余リ明瞭デナカッタ爲メト見エル。SCHLECHTER ガ *C. Thunbergii* ＝關シ、„Die Art ist entschieden noch aufzuklären und es wird Aufgabe der japanischen Sammler sein, die Frage der Verschiedenheit dieser Spezies von *C. speciosum* ROLFE zu lösen.” (in FEDDE, Repert. Beih. Bd. 4, p. 84.)—モツトモ SCHLECHTER ハ出典ヲ誤記シテキルガ—ト云ツテキルコトハ面白イ。

Cypripedium Thunbergii BLUME, Orch. Arch. Ind. p. 169 (1858); NAKAI in Journ. Jap. Bot. XVI. p. 63 (1940); MAKINO, Ill. Fl. Nipp. p. 705, t. 2114 (1940)—Syn. *Cypripedium speciosum* ROLFE in Kew Bull. p. 207 (1911).

forma **flavidum** HIYAMA, nov. f.

Floribus flavidis a typo diversa.

Nom. Jap. *Usuki-atumorisō*.

Hab. Honsyu: Prov. Kai. Mt. Mitutōge (leg. Kōzō HIYAMA, June 10, 1934— in Herb. Tokyo Sci. Mus.). (Kōzō HIYAMA)

○パラオ群島ノ椰子類其他ノ土名及ビ和名 (津山 尙)

我南洋群島ノ南西端＝位置シ、マレーシア＝最モ近クアツテ群島中デ一番ソノフローラノ豊富ナコトヲ誇リ顔ナル パラオ群島＝ハ、やし科植物モ最モ多ク、ソレ等ハ、*Cocos nucifera* LINNAEUS, *Areca Catechu* LINNAEUS, *Nypa fruticans* WURMB, *Glubiopsis palauensis* BECCARI, *Heterospatha palauensis* BECCARI, *Pseudopinanga insignis* BURRET, *Ponapea palauensis* KANEHIRA ノ各種デアル。コレラノ中、海岸ノ砂地生ノココヤシハ多ク栽培サレ、島民ノ生活上ニ必要缺クベカラザルモノデアル。びんろうノ果實ハ、島民ガ石灰粉ト きんまノ葉ト共ニ嚙ンデ、嗜好料トスル。コノモノハ時ニ野生化シタモノガ見ラレルニ過ギナイ。紅樹林帯ノ泥中ニ幹ヲ横ヘテ繁殖スル につばやし モ又時ニハ栽培サレ