

Oxytropis ochrantha TURZANINOW きばなのふじぼえんどう

包頭 (n. 40, June 1937):

Rosaceae

**Potentilla bifurca* var. *glabrata* LEHMANN

[*Potentilla* sp. SATAKE in Journ. Jap. Bot. XVI, 610 (1940)].

くさきんろうばい 包頭 (n. 38, June 1937).

Ranunculaceae

**Clematis fruticosa* TURZANINOW [*Clematis* sp. SATAKE in Journ. Jap. Bot. XVI, 611 (1940)].

シヤラモリスーム (n. 157, Aug. 24, 1939).

○さつまのぎく臥蛇島ニ産ス (土井美夫)

數年前、鹿児島縣立第一中學校ノ永井龜彦氏ノ私宅デ、筆者ハ同氏ガトカラ列島ノ臥蛇島南岸デ採リ、同地ヨリ持チ歸ラレ栽培セラレテキルきく屬ノ一種ヲ見セラレタコトガアツタ。其際ハ花時デナカツタノデ斷定シ得ナカツタガ、姿ハさつまのぎくソツクリノモノデアツタ。昨春、永井氏ノ御厚意ニヨリ該苗ノ分譲ヲ受ケ、自宅ニ栽植シタモノガ11月下旬ニ開花シタノデ、今回さつまのぎく (*Chrysanthemum ornatum* HEMSLEY) ト同定スルコトヲ得タ。コノ産地ハ新ニ知ラレタモノデアリ又同時ニさつまのぎくノ分布ノ南限デアル。尙永井氏がさつまのぎくヲ採集セラレタノハ 1935 年 10 月 4 日デアル。

○のぢぎくノ一新品種よしとしのぢぎく (土井美夫)

1940 年 12 月 17 日薩摩國吉利村ヘのぢぎくノ調査ニ行ツタ際、花ノ純白ナノぢぎくノ群落中ニ一群落全部 (10 數株) ガ舌狀瓣ノ紅紫色ヲ呈シテキルヲ見出シタ。

のぢぎくノ仲間デハ、きばなのぢぎくノヤウニ舌狀瓣ガ黃色ヲ示スモノガアツタリ (コレニハ濃淡ノ程度ハ色々現ハレル) 又純白色ノモノデモ花期ノ終リニ近ヅクト、1 株中ノ頭狀花ノ一部ガ紅紫色ヲ示スモノ、アルコトハ既知ノ事實デアル。然ルニ今此處ニ記スモノハ、1 株中ノ舌狀瓣ハ蕾ノモノカラ開花シタモノマデ全部一樣ニ紅紫花ヲ呈スルモノデアツテ、純白色ヨリ紅紫色ニ至ル中間色ノ濃度ノモノハ見ラレナイ。コノモノハのぢぎくノ一新品種ト考ヘラレルノ産地ニ因ンデよしとしのぢぎくノ新稱ヲ附スルコトニシタイ。

Chrysanthemum japonense NAKAI

forma *satsumense* DOI, forma nov.

Flores purpurascentes.

Nom. Jap. *Yositosi-nojigiku* (nov.).

Hab. Japonia, Kiusiu: Prov. Satsuma, Yositosimura (leg. Y. DOI, 17. Dec. 1940—typus).

○霧島山ニ新ニ産スルコトヲ知ラレタルニ・三ノ植物ニ就テ (土井美夫)

1938 年 9 月 23, 24 ノ兩日、霧島山ニ採集調査ニ赴イタ際つくしありどほしらん、くろごけノ 2 種ヲ得タ。コレト前後シテこぼろぎらんモ同山ニ産スルコトヲ知ツタ。コレ等ハ霧島山ニハ從來未知デアツテ、新産地ト思ハレルノデ以下少シ記シテ置キタイ。