

*Cucurbita latior folio molli, flore albo* J. BAUHINUS, Hist. Pl. Univ. II 215 cum fig. (1650); Raius, Hist. Pl. I, 638 (1686).

*Cucurbita seminibus obsolete bicornibus* LINNÆUS, Hort. Cliffort. 451 (1737).

*Cucurbita Lagenaria* LINNÆUS, Sp. Pl. II 1010 (1753), pro parte.

*Lagenaria vulgaris* var. *turbinata* SERINGE in DE CANDOLLE, Prodr. III 299 (1828).

*Lagenaria vulgaris* var. *magna* HARZ, Landwirt. Samenkunde 791 (1885).

デアル。

ばかちノ一種デ朝鮮デ水ヲ汲ムトキニ用キル特ニ小型デ直径 10 cm カラ 12-13 cm 位デ頭ノ部分ガ急ニ細クナリ長サ 7-8 cm 位ノ柄ニナルモノガアル。其成熟シタ果實ヲ煮テ縦ニ兩斷シ中味ヲ取去ツテ乾スト柄附ノ水飲ガ出來ル此モノハ植物同好者ノ張了斗君ニヨルト京城又ハ開城デハ Pyöng-pak トイフ多分壘瓠ノ意デアラウ、又全羅南道デハちよんぐれみトイフガ其意味ハ判ラヌトノ事デアル。此變種ニモ學名ハアル即チ

*Lagenaria leucantha* RUSBY var. *cougourda* (SERINGE) NAKAI, comb. nov.

Syn. *Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli* MORISON, Hist. Pl. Oxon. II 23 t. 5 f. 1 (1680).

*Cucurbita Lagenaria* LINNÆUS, Sp. Pl. II, 1010 (1753), pro parte.

*Cucurbita lagenaria* a. *La Cougourde* LAMARCK, Encyclop. II, 150 (1786).

*Lagenaria vulgaris* β. *Cougourda* SERINGE in DE CANDOLLE, Prodr. III, 299 (1828).

デアル。へうたん、ゆうがほノ類ハ要スルニ *Lagenaria leucantha* 一種ニ屬スルノデハアルガ其園藝種ハ固定シタ變種デアツテおもと、あさがほ、まんりやうナドノ様ニ種子ヲ蒔クト種々ニ變ル様ナ性質ノモノデハナイカラ假令昔、人工ニヨリ變ツタモノデアツテモ變種トシテ取扱ツテ置ク、*Lagenaria leucantha* ガモト何處ニ原産シ何時ノ頃ニ人類ガ之ヲ水入レニシテ用キ始メタカ食用ニシ始メタカハ殆ンド空想的ノ事デ判ラヌ。其故學者ニヨリ亞細亞ヲ原産トイヒ阿弗利加ヲ原産トイフ、昔カラ阿弗利加ヤ亞刺比亞ノ沙漠ヲ旅行スルモノガ硝子ノ壘ノ出來ナイ前ニハへうたんヲ水入レニシテ持歩イタ事ハ諸書ニ出テ居ル。

(昭和 16 年 11 月 22 日稿)

## 〇ひろはまつな (新種) (原 寛)

はまつなニヨク似タモノデアルガ、ソレヨリ葉ハ扁平ガ幅廣クナリ、萼片ハ果時背部ガ著シク肥厚スルタメ萼全體ハ稍星狀ヲ呈シ、種子ハ扁平デ少シク大キク、肉質デオリープ色、種皮ハ薄ク膜質デアル。古イ乾燥標本デハ時ニ區別ガ困難ナ時モアルガ、生品デハ直チニ識別デキル。現在デハ肥前、時津・三浦、備後、尾ノ道ニ産スル事ガ判ツテキル。同ジク九州カラ記載サレタしちめんさうハ、種子ノ性質ガ本種ニヨク一致スルガ、葉ハ略圓柱狀デ鈍頭、萼片ハ果時多少肥厚スルガ、萼全體ハ扁球狀デ明カニ別種デアル。又滿鮮ニ産スルおほはまつなハ葉細ク半圓柱狀デ、花序ノ葉ハ更ニ短カク、萼片ハ果時先端及ビ基

部著シク肥厚シ突起ヲ有シ、硬イ黒色光澤アル種皮ヲモツタレンズ狀ノ小サイ種子ヲ生ズルノデ異ツテキル。併シはまつな類ノ種子ニ就テハ注意スベキ事ガアル。ソレハ同一種デアリナガラ異ツタ二型ノ種子ヲ生ズルモノガアルカラデ、ILJIN ハソレ故はまつな類ヲ含ム節ニ Heterosperma (異種ノ種子) トイフ名ヲ用ヒタ位デアル。一ハ硬イ黒色デ光澤アルレンズ狀ノ種子デコレガ正常ノモノト思ハレ、他ハ肉質デ扁平、種皮ハ薄膜質デ、内ニ營養質ヲ含マズ、綠色ノ胚ヲ有スルモノデアル。後者ハ秋期ノ花カラ生ズルトイフ想像モアルガ、殆ド同時ニ開花スルはまつなが皆硬イ種子ヲ作ルカラ開花ノ時期ノ差デハナイ。又營養状態ニヨルトモ考ヘラレテキル。はまつな類ニハ兩全花ノ外ニ雌性花ヲ有スルモノガアリ、コレモ種子ニ二型ヲ生ズル原因デハナイカ一考ヲ要スル。ひろはまつなノ雄蕊ハ發育悪ク花ハ殆ド雌性ト考ヘラレルカラ、ソノタメ種皮ノ薄イ型ノ種子ノミヲ生ズルノダト解釋スレバ、コノ推察ガ正シイ一例トモ見ラレル。兎ニ角コノ問題ハ實驗ニヨツテノミ解決サレルモノデ、二型ノ種子ヲ發芽サセ如何ナル個體ヲ生ズルカヲ觀察スルノハ非常ニ興味深イ事ト思フ。コノ種子ノ性質ト他ノ特徴トガ如何ニ關聯シテキルカモ現在デハ全く未解決デアルノデ、種子以外ノ他ノ性質デモ既知ノ種ト區別デキルひろはまつなヲ一先ツ新種トシテ報告スル。

終リニワザワザ遠方ヨリ生品ヲ送ツテ下サツタ F. C. GREATREX 氏、外山三郎氏、吉岡重夫氏ニ謝意ヲ表シマス。

**Suaeda malacosperma** HARA, sp. nov. (Sect. Schoberia).

Planta annua glabra. Caulis 10–30 cm altus ramosus raro simplex, ramis ascenditibus vel divaricato-ascendentibus, rubescens autumno ruber superne sulcato-striatus. Folia erecto-patentia lanceolato-linearibus carnosa planiuscula apice acuta vel obtusiuscula mucronulata basi paulo attenuata sessilia supra plana dorso leviter convexa ad 3.5 cm longa 4 mm lata caerulescenti-viridia autumno interdum rubescentia, florifera inferiora caulinis similia superiora sensim abbreviata lanceolata flores multo vel saltem duplo superantia. Flores axillares 1–4-aggregati sessiles vulgo feminei. Bracteolae minutae albo-membranaceae. Calyces depresso-globosi, lobis 5 ovatis obtusis conniventibus; in fructu depressi substellatim 5-angulati 2–3 mm in diametro virides demum rubescentes, lobis clausis carnosus dorso medio triangulariter carinato-incrassatis intus concavis. Stamina inclusa saepe abortiva. Stigmata 3 vel 2 brevissima subulata exserta. Utriculi depressi olivacei demum fusciscentes; pericarpium tenue membranaceum. Semina horizontalia plano-compressa carnosula 1.4–2 mm in diametro; testa alba tenuis membranacea; embryo spirale viride.

Nom. Jap. *Hiroha-matuna* (nom. nov.).

Hab. Kyusyu. Prov. Hizen: ad lacuna maritima Tokitu, Nisi-sonoki-gun (F. C.

GREATREX, N. 14/40, Oct. 17, 1940, N. 33a/41, Sep. 27, 1941, fl.; N. 33b/41, Oct. 28, 1941, fr.; N. 33c/41, Nov. 15, 1941, fr.—typus); ad litore Miura-mura, Higasi-sonoki-gun (S. TOYAMA, Nov. 3, 1941, fr.).

Honsyu. Prov. Bingo: Mukô-zima, Onomiti (Z. TASIRO, Oct. 30, 1932, no. 38860 in Mus. Sc. Tokyo). (H. HARA)

### ○みやませんきうノ學名變更 (原 寛)

昨年ノ本誌17卷631頁私ハみやませんきうヲ新種トシテ發表シタガ、ソノ後 WOLFF 氏ガ北海道落合及ビ月山? 産標本ニ基イテ1925年ニ記載シタ *Peucedanum filicinum* ガみやませんきうデアラシイ事ガ判ツタノデ、次ノ様ニ學名ヲ變更スル。

**Conioselinum filicinum** (WOLFF) HARA, comb. nov.

*Peucedanum filicinum* WOLFF in FEDDE, Rep. XXI, 246 (1925).

*Conioselinum nipponicum* HARA in Journ. Jap. Bot. XVII, 631, fig. 52 (1941).

(H. HARA)