

○Dicalix = 就テ (御江久夫)

東亞産ノ *Symplocos* ノ大部分ニ對シテ近來ハ *Bobua* ナル屬ガ用ヒラレル様ニナツタ。コノ *Bobua* ハ中井教授ノ大日本樹木誌ニアル通りデ今更説明ノ要ハナイ。而シテ本屬ノ基準種ハ DC., Prodr. III, p. 24 (1828) ヲ見レバ判ル様ニ印度産ノ *B. laurina* DC. デアル。本種ノ性質ハコレ亦説明ノ要ナク各種ノ文獻ニ明ラカデアルガ、子房ハ3室デ果實ニナルト1室*ニナツテ了フ。

サテ、此レトハ別ニ佛印カラ南支ヘカケテ *Symplocos cochinchinensis* MOORE ナル植物ガアル。コレハ *Dicalix cochinchinensis* LOUREIRO カラ導レタ組合セ名デ LOUREIRO ノ原文ヲ見ルト如何ナル植物カ全ク想像サヘモ不可能デアルガ、MOORE = 依リコノ基準種本ガ檢セラレ、上記ノ様ナ學名ニ當ル植物ナル事ガ明ラカニナツタ。今、南支産ノ標本ニ就テ見ルト、本種ノ花ノ構造ハ *B. laurina* ト同ジク子房ハ3室、果實ハ壺狀デ1室、花序ハ基部デ3岐スル spike, 小苞ハ永存性デアル。LOUREIRO ガ兩性花ト雌花ガ別株ニ着クト言ツテ居ルノハ、去年ノ枝ニ果實ガ着キ今年ノ枝ニ花ガ着クヲ別々ノ標本デ見テ考ヘ違ヒタノデハアルマイカ。筆者ノ見テ居ル標本ニハ其ノ様ナ兩様ノ花ハナイ。マタ氏ガ raceme ガ分枝シナイト言ツテ居ルノハ spike ガ基部以外デハ分枝シナイカラデアリ、萼ガ二重ニアルトイフノハ永存性ノ小苞ガ顯著デアル事カラ起キタ錯覺デアラウト思フ。即チ前述ノ *B. laurina* ト *D. cochinchinensis* トノ間ニハ屬ヲ分カツニ足ル特異ナ點ハ無イカラ從來色々ノ人ニ依ツテ取扱ハレタ様ニ *Bobua* ト *Dicalix* トハ全ク同一屬トイフ事ニナル。其處デ既ニ金平教授ガ臺灣博物學會會報 XX, p. 382 (1930) デ指摘サレテ居ル様ニ *Bobua* ノ代リニ出版年代ノ早イ *Dicalix* ヲ採用シナケレバナラナイ。コレニ就テ筆者ノ手許ニハ文獻モ標本モ充分ニナイカラ詳細ナ事ハ他日ニ期スル事ニシテ今ハ唯次ノ様ニ概略ヲ記スルニ留メル。

Dicalix LOUREIRO, Fl. Cochinch. p. 663 (1790); MIERS in Journ. Linn. Soc. XVII, p. 296 (1879).

Bobu HERMANN, "Mus. Zeyl. p. 9 (1717)"; ADANSON, Fam. Pl. II, p. 88 (1763).

Eugeniodes (oides) LINN., "Fl. Zeyl. p. 192 (1747)"; O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. II, p. 409 (1891) pro parte.

Bobua DC., Prodr. III, p. 23 (1828); MIERS, loc. cit. p. 303 (1879); NAKAI, Trees & Shrubs Jap. ed. 2, p. 314 (1927).

本屬ノ果實ハ最後マデ明確ニ3分サレテ居ルモノト間モナク1室トナルモノガアル。1室トナルモノニモ若干ノ型ガアルガ *Syml. cochinchinensis* 型ニ於テハ GUILLAUMIN ガ LECOMTE, Fl. Gén. Indo-China, III, p. 998, fig. 114 (1933) = 圖示シテ居ル様ニ隔壁ノ一部ガ立派ニ殘ル。コレニハ支那デ普通 *B. laurina* ト稱セラレテ居ル種類(實ハ數種ノ混稱デアル)ガ屬シ、マタ同型ト思ハレルモノニ日本産植物 *B. theophrastaeifolia*

* コレハ果實ノ成熟スルニ從ツテ隔壁ガ不分明トナリ1室ニ見エル事ヲ指スノデアル。實際ハ薄膜又ハ海綿狀組織デ3分セラレテ居ルノデアラウガ、乾燥標本デハコレヲ確認スル事ガ出来ナイ。

NAKAI ヤ *B. kotoensis* YAMAMOTO ガアル。即チ現在用ヒラレテ居ル *Bobua* ノ範圍ハ頗ル廣イケレドモ元來コノ型ガ *Bobua* proper デアリ又同時 = *Dicalix* proper デモアル。ナホ、MIERS ハ *Dicalix* ガ 1793 年 = 設立サレタ様 = 記シテ居ルガ、其レハ誤リデ LOUREIRO, Fl. Cochinch. p. 663 (1790) ガ正シイ。氏ハ本書ノ WILLDENOW 版ヲ引用シタカラソウナツタノデアラウ。又本屬ヲ *Dicalyx* ト綴ル人多イガ筆者ハ *Dicalix* ガ宜イト思フ。何故カトイフ = LOUREIRO ノ原著ヲ見ルト單 = 萼ヲ指ス場合 = ハ calyx ト綴ツテ居ルガ、屬名ノ場合 = ハ必ず *Dicalix* ト綴ツテ居リ、決シテ植字ノ誤トモ不注意 = 基ク誤記トモ受取レナイカラデアル。併シコレガ orthographic variant デアル事ハ言フ迄モナイ。

次 = 本屬ノ基準種 = 就テ關係文獻ヲ擧ゲテ置ク。

Dicalix cochinchinensis LOUREIRO, Fl. Cochinch. p. 663 (1790), excl. syn.; LAMARCK, Encycl. Suppl. II, p. 469 (1811), excl. syn.; MIERS in Journ. Linn. Soc. XVII, p. 296 (1879), excl. syn.; BRAND in ENGLER, Pflanzenreich, Heft 6, p. 90 (1901).

Symplocos cochinchinensis (LOUR.) MOORE in Journ. Bot. LII, p. 148 (1914); GUILLAUMIN in Bull. Soc. Bot. France, LXXI, p. 277 (1924); MERRILL in Lingnan Sci. Journ. V, p. 146 (1927); GUILLAUMIN in LECOMTE, loc. cit. (1933); MERRILL in Transact. Amer. Philos. Soc. n. ser. XXIV-2, p. 304 (1935).

Symplocos ferruginea ROXB. sensu HANCE in Journ. Bot. XIV, p. 307 (1876); HEMSLEY in Journ. Linn. Soc. XXVI, p. 72 (1889); DUNN & TUTCHER, Fl. Kwangt. Hongk. p. 163 (1912).

Symplocos javanica KURZ sensu REHDER in SARGENT, Pl. Wils. II, p. 597 (1916); G. W. GROFF, DING & E. H. GROFF in Lingnan Sci. Journ. II, p. 126 (1924).

Symplocos ferruginifolia KANEHIRA in Transact. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX, p. 383 (1930); ibid. Formosan Trees, rev. ed. p. 585, fig. 542 (1936).

Hab. Kwangtung—Yam Na Shan, Mei District (W. T. TSANG, no. 21377, Aug. 4-31, 1932).

Hainan—Nodao and vicinity, Taam-chau District (W. T. TSANG, No. 15555, Jul. 17, 1927).

Distr. Formosa, China australis, Indochina et?

一般 = 本種ト蘭印カラ印度方面ヘカケテ産スル *Syml. ferruginea* ROXB. トハ同種トセラレテ居ルガ、コノ當否ハ筆者 = ハ判ラナイ。Symlocaceae ノ種類ハ分布區域ノ狭イノガ普通デ、コノ様 = 熱帶亞細亞ノ大半 = 亙ツテ分布スルト云フ事ハ多少疑ハシイノデ、此處デハ殊更 = 他地方關係ノ文獻ハ除外シタ。ナホ、臺灣デ金平教授 = ヨツテ見出サレタかんこうハひのきハ本種ト同一種ト考ヘラルノデ異名 = 加ヘタ。