

## ○一寸がやつり (正宗嚴敬)

Genkei MASAMUNE: *Cyperus cuspidatus* H.B.K. a new addition to the Flora of Taiwan & Hainan.

先日當教室ノ鈴木君ヨリ飯尾正氏ノ臺中州后里デ採集サレタ、極小形ノかやつりぐきノ一種ノ標品ヲ得タ。ソノ標品ヲ見ルニ高サ 3 cm 内外デ、叢生スル物ラシク、此ヲ KÜ-KENTHAL 氏ノ Pflanzenreich = 出サレタ Cyperaceae-Scirpoideae-Cyperae = ヨツテ見ルニ、Eucyperus 亞屬ノ Amabiles 節ニ入ル事ガ解リ、又此ノ内ノ *Cyperus cuspidatus* = 相當スルラシイ事ガ明ニナツテ來タ。然シ KÜKENTHAL 氏ニヨルト 'Spiculae 1-1½ mm latae' トナツテ居リ、此ノ標品デハ 2mm 位ナノデ、少シ異ルガ、他ノ諸性質ハ、マヅ一致スルノデ本種ト 同定シテ此所ニ發表スル事ニシタ。猶ホ 早田先生ガ ひめあぜてんつき *Cyperus uncinatus* POIR. var. *formosanum* HAY. ヲ 發表サレテキルガ、記載ヲ伴ナツテキナイノデ不明デア  
ルガ、モシ本種ト同ジ  
デアラナラバ、此ノ *C.*  
*uncinatus* POIR. ハ  
*C. cuspidatus* トスベ  
キデアラカラ、シタガツ  
テ *C. cuspidatus* var.  
*formosanum* (HAY.)  
トナルベキデアラガ、  
此ノ事ハ原標品ヲ見ル  
マデ保留スル事ニス  
ル。圖ハ鈴木時夫君ノ  
描寫スル所ニシテ、幾  
分廓大シテアル。

先ニ本教室カラ海南  
島ニ植物ノ調査旅行ヲ  
行ツタ時本種ト考ヘラ  
レル物ヲ、萬寧近クデ  
採集シタガ、之ハ海南  
島ニ於ケル最初ノ記録  
ト考ヘラレル。

畢リニ圖及標品ヲ與  
ヘラレタ鈴木君ニ感謝  
ノ意ヲ表ス。



*Cyperus cuspidatus* H. B. K. 一寸がやつり。

*Cyperus cuspidatus* H.B.K., Nov. Gen. et Sp. p. 204 (1815); BENTH., Fl. Austr. VII. p. 267 (1878); C.B. CLARKE in Journ. Linn. Soc. Lond. Bot. XXI. p. 88 (1884) et in Hook. f., Fl. Brit. Ind. VI. p. 598 (1893); KÜKENTHAL, in ENGL., Pfl.-reich Heft. 101, p. 261, fig. 29, E. (1936).

Syn. *Cyperus capitatus* RETZ. Observ. IV. p. 9 (1786)?

*Cyperus uncinatus* C. B. CLARKE in DURAND et SCHINZ, Consp. Fl. Afr. V. p. 580 (1895); HAY., Mater. Fl. Formos. p. 374 (1911)?

*Cyperus uncinatus* var. *formosanus* HAY., Gen. Ind. Fl. Formos. p. 91 (1916)?

*Cyperus cuspidatus* H.B.K. var. *formosanus* (HAY.) MASAMUNE.

Spiculae ca. 2 mm latae.

Nom. Nipp. Issun-gayaturi.

Hab. Formosa: On dry ground in Sugar cane field. Kori, Toyohara-gun. Taityū-syū, Taiwan (leg. Ito, Herb. T.); Hainan: Mannei (leg. MASAMUNE et FUKUYAMA).

(臺北帝大理農學部植物學教室)

### 〇にしきけていかかづら (新稱) (初島住彦・外山三郎)

長崎縣大村市、縣社大村神社ノ境内ニけていかかづらノ斑葉品ノ栽培サレタモノガアル。根元ノ莖周 17 cm モアツテ此ノ種トシテハ極大ノモノデハナイカト思フ。而シテスベテノ葉ノドノ部分ニモ普通品ノヤウナみるいろ\*(海松色)ニ近イ色ハ全ク見ラレズスベテノ葉ガリきウシラちヤ\*(利久白茶)ニ近イ色トワカナヘいろ\*(若苗色)ニ近イ色トおひみどり\*(老綠)ニ近イ色トガ不規則ナ斑ヲナシテ非常ニ美シイ。而モ毎年冬ニハ向陽面ガ一齊ニウすひ\*(淺緋)乃至ウすくれなる\*(淺紅)ニ染マツテ其ノ麗シサハ喩ヘヤウガナイ(普通品モ往々紅葉スルガソレハ美シイ場合デベニゑびちヤ\*(紅海老茶)ニ近イ色デアル。未ダ名ガナイヤウデアアルカラハにしきけていかかづらト呼ブトニシ次ノヤウニシテハト思フ。

*Trachelospermum jasminoides* LEMAIRE

form. *variegatum* HATUSIMA et TOYAMA, form. nov.

Folia margine late albivariiegata.

Nom. Nipp. Nisiki-Keteikakazura (nov.).

Hab. Kyūsyū, Prov. Hizen, Ōmura, cult. (S. TOYAMA, Apr. 20, 1940—Typus).

\* 和田三造, 日本色名帖ニヨル。