

Cyperus cuspidatus H.B.K., Nov. Gen. et Sp. p. 204 (1815); BENTH., Fl. Austr. VII. p. 267 (1878); C.B. CLARKE in Journ. Linn. Soc. Lond. Bot. XXI. p. 88 (1884) et in Hook. f., Fl. Brit. Ind. VI. p. 598 (1893); KÜKENTHAL, in ENGL., Pfl.-reich Heft. 101, p. 261, fig. 29, E. (1936).

Syn. *Cyperus capitatus* RETZ. Observ. IV. p. 9 (1786)?

Cyperus uncinatus C. B. CLARKE in DURAND et SCHINZ, Consp. Fl. Afr. V. p. 580 (1895); HAY., Mater. Fl. Formos. p. 374 (1911)?

Cyperus uncinatus var. *formosanus* HAY., Gen. Ind. Fl. Formos. p. 91 (1916)?

Cyperus cuspidatus H.B.K. var. *formosanus* (HAY.) MASAMUNE.

Spiculae ca. 2 mm latae.

Nom. Nipp. Issun-gayaturi.

Hab. Formosa: On dry ground in Sugar cane field. Kori, Toyohara-gun. Taityū-syū, Taiwan (leg. Ito, Herb. T.); Hainan: Mannei (leg. MASAMUNE et FUKUYAMA).

(臺北帝大理農學部植物學教室)

〇にしきけていかかづら (新稱) (初島住彦・外山三郎)

長崎縣大村市、縣社大村神社ノ境内ニけていかかづらノ斑葉品ノ栽培サレタモノガアル。根元ノ莖周 17 cm モアツテ此ノ種トシテハ極大ノモノデハナイカト思フ。而シテスベテノ葉ノドノ部分ニモ普通品ノヤウナみるいろ*(海松色)ニ近イ色ハ全く見ラレズスベテノ葉ガリきウシラちヤ*(利久白茶)ニ近イ色トワカナヘいろ*(若苗色)ニ近イ色トおひみどり*(老綠)ニ近イ色トガ不規則ナ斑ヲナシテ非常ニ美シイ。而モ毎年冬ニハ向陽面ガ一齊ニウすひ*(淺緋)乃至ウすくれなる*(淺紅)ニ染マツテ其ノ麗シサハ喩ヘヤウガナイ(普通品モ往々紅葉スルガソレハ美シイ場合デベニゑびちヤ*(紅海老茶)ニ近イ色デアル。未ダ名ガナイヤウデアアルカラハにしきけていかかづらト呼ブトニシ次ノヤウニシテハト思フ。

Trachelospermum jasminoides LEMAIRE

form. *variegatum* HATUSIMA et TOYAMA, form. nov.

Folia margine late albivariiegata.

Nom. Nipp. Nisiki-Keteikakazura (nov.).

Hab. Kyūsyū, Prov. Hizen, Ōmura, cult. (S. TOYAMA, Apr. 20, 1940—Typus).

* 和田三造, 日本色名帖ニヨル。