


○こくらまごけ九州ニ産ス (土井美夫)

最近 *Selaginella* 屬ノ整理ヲシテキル中ニこくらまごけト同定シウルモノガアツタノデ此處ニ同品ノ第二ノ産地トシテ報告スル。即チ筆者ガ 1933 年 3 月 27 日大隅國佐多村伊坐敷カラ大泊ニ至ル途上デ採集シタモノデアル。本種ハ小泉教授ノ記サレシ如ク檢鏡スレバ脊葉・腹葉共ニ基部ニ近ク長形ノ微針ヲ有スルヲ以テ一見シテ近縁種ト識別シ得ラレル。挿入ノ圖ハ廣島文理大 新敏夫君ノ描キシモノデ記シテ君ノ厚意ヲ謝ス。



こくらまごけ
1. 脊葉 ×26. 2. 腹葉 ×26.

Selaginella utchinensis KOIDZ. in Acta Phytotax. et Geobot. IV, 229 (1935).

Nom. Jap. *Ko-kuramagoke*

Hab. Japonia: Kyūsyū. Satamura, Prov. Osumi. (Leg. Y. Doi, in Herb. Y. Doi, No. 4598, Mars. 27, 1933).

Distr. Loochoo: insl. Uchina.

A new addition to the flora of Kyūsyū.

(Y. Doi)

○おほくさあぢさゐノ學名 (御江久夫)

臺灣産ノおほくさあぢさゐト支那産ノ所謂 *Cardiandra sinensis* HEMSLEY トハ葉形、鋸齒ノ状態、莖ノ大キサ等ニ差異ガアルトイフノデ別種トサレテ居ルガ、多數ノ標本ニ就テ觀察スルト、コレ等ハ單ニ個體ノナ變異デ、兩者ハ全ク同一種デアル事ガ判ル。且學名モ從來ノモノハ首肯シ難イノデ次ノ様ニ改メル。

Cardiandra Moellendorffii (HANCE) MIGO, comb. nov.

Hydrangea Moellendorffii HANCE in Journ. Bot. XII, p. 177 (1875); HEMSLEY in Journ. Linn. Soc. XXIII, p. 274 (1887); REHDER in SARGENT, Pl. Wils. I, p. 37 (1911).

Cardiandra alternifolia (non S. & Z.) FRANCHET, Pl. David. p. 126 (1884); HEMSLEY in loc. cit. p. 278 (1887); MATSUDA in Bot. Mag. Tokyo, XXV, pp. 82 & [459] (1911).

Cardiandra sinensis HEMSLEY in Gardn. Chron. 3 ser. XXXIII, p. 82 (1903); HAYATA, Fl. Mont. Formosa, p. 92 (1908); REHDER in SARGENT, Pl. Wils. I, p. 24 (1913); CHIEN in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, III, p. 47 (1927).

Cardiandra formosana HAYATA in Bot. Mag. Tokyo, XX, p. 55 (1906); MATSUMURA & HAYATA, Enum. Pl. Formosa. p. 132 (1906); HAYATA, Mat. Fl. Formosa, p. 107 (1911) & Icon. Pl. Formosa. II, p. 10 (1912); T. SUZUKI in MASAMUNE, Short Fl. Formosa, p. 80 (1936).

Cardiandra alternifolia var. *Moellendorffii* (HANCE) ENGLER, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. XVIII-a, p. 201 (1930); HANDEL-MAZZETTI, Symb. Sin. VII, p. 441 (1931); TSOONG in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping, IV, p. 105 (1936).

Distr. Formosa & China austro-orientalis.