

○みかはばいけいさう (新稱) (佐竹義輔)

鳥井喜一氏ガ三河國東郷村デ採集サレタうらげこばいけい *Veratrum stamineum* var. *lasiophyllum* NAKAI = 似タ1種デアル。葉ハ細長ク、裏面 = 白色ノ柱狀毛ガ密生シ、花ハ小形デ、瓣片 = 脈ガ多イノデ區別サレル。コレヲ提供サレタ林 彌榮氏ノ話 = ヨルト、生育地ハ低イ所デ、こばいけいとハ生態的 = モ違フト云フコトデアルカラ、或ハ別種トシテ取扱フ方ガヨイカモ知レヌ。今後ノ研究ヲ要スル。

Veratrum stamineum MAXIMOWICZ

var. **micranthum** SATAKE, var. nov.

Laminae foliorum ellipticae, 18–20 mm longae 6–8 cm latae, supra glabrae subtus densius albo-papillosae. Flores parvi, petalis ovatis apice obtusis, basi cuneatis, 5 mm longis 4 mm latis, multi-nervatis.

Hab. Honsyû: prov. Mikawa, Tôgô-mura (K. TORII, May, 1940—type in Herb. Tokyo Sci. Mus.).

○いぶきせんとさう (新稱) (佐竹義輔)

伊吹山ノ西麓 = 産スルせんとさうノ1種ハ葉ガ3出又ハ2回3出シ、前者 = 於テハ小葉ハ三角狀廣卵形デ長サ 30–35 mm、幅 30–40 mm デ淺ク或ハ深ク3裂シ、後者 = 於テハ小葉ハ廣楔形デ長サ 13–30 mm、幅 10–20 mm アリ、一見シテせんとさうヨリ著シク大形ノ葉ヲ有スルノデ區別ガツク。いぶきせんとさうノ新名ヲ與ヘルヨトニシタ。

Chamaele decumbens MAKINO

forma **dilatata** SATAKE et OKUYAMA, f. nov.

Folia ternata, foliolis late triangulari-ovatis 30–35 mm longis 30–40 mm latis, leviter vel profunde 3-lobatis, vel biternata foliolis late cuneatis 13–30 mm longis 10–20 mm latis.

Nom. Jap. Ibuki-sentôsô (nov.).

Hab. Prov. Oomi, in monte Ibuki (SATAKE et OKUYAMA, May 1942).

○松村先生ノ南方植物ニ對スル新和名 (津山 尚)

松村先生ノ日本産植物ヤ園藝植物ニ對スル和名ノ御命名ハ、先生ガ永ラク東京帝國大學教授ト兼ネテ小石川植物園長ヲシテ居ラレタタメモアツテ莫大ナ量ニナツテキル。今ココニアル東洋學藝雜誌 第 201 號 (明治 31 年 6 月 25 日發行) ヲ開イテ見ルト「琉球臺灣植物雜誌」ナル御論著ガアルガ、コレ等ハ比較的 = 其ノ他 = 比シテ世ノ注意ヲ惹イテキナイモノデアアルマイカト思フ。コノ中ニハ 56 項目 = 互ツテ其ノ地ノ植物 = 關スル簡單ノノートガ含マレテキテ、新檢出ノ植物、和文ノ記載、新和名、琉球及ビ臺灣デノ地方名 (土名) 及ビ其ノ解釋等アリ、ナカナカ興味ガ深イモノデアル。最近日本ノ南進 = ツレテマングローブ = 關スル文ガ多ク印刷サレタガ、ソノ構成分子ノーツデアル *Sonneratia alba* SMITH = 就テハ次ノ様ニ述ベラレテキル。

「八重山、西表島間、仲間ヨリ南風見 = 至ルノ海濱、潮ノ來ル所 = 一種ノ樹類ヲ生ズ。幹