

Hedyotis Hondae HARA, nom. nov.

Oldenlandia hirsuta L. f. var. *glabra* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLV, 2 (1931).

O. glabra [non *O. KUNTZE* 1891] (HONDA) HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLVII, 297 (1933).

H. Lindleyana HOOK. var. *glabra* HARA, mss.

Nom. Jap. *Ô-hasikagusa* (HONDA 1931).

Dist. Honsyu (Ugo, Rikutyû, Iwasiro, etc.).

H. Lindleyana HOOKER ハ極メテ不完全ナ形式デ發表サレタ學名デアルガ、*Hedyotis* 屬ノ下デハヨリヨイ名デアル *H. hirsuta* (L. f.) ノ組合セガ先行名ガアリ用ヒラレナイノデ止ムヲ得ナイ。*O. hirsuta* var. β . *glabrior* MIQUEL (1830) ハまるみのはしかぐさカ又ハはしかぐさノモノ少イ形デアルカ原標本ヲ見ナクテハ決定デキナイノデ除外シタ。

○我が南洋ニ歸化シタ一種 (津山尙)

最近久内氏ニヨツテ内地ニ歸化シタ多クノ輸入植物ガ紹介サレタガ、ココニ南洋群島ニ歸化シタ一草ガ在ル。高サハ 25 cm 許デ、下部ハ木化シ、僅カニ枝ヲ分チ、莖ハ直立シテ全體ニ稍長イ散毛ヲ有シ、ソノ上ニ 3 小葉ヲ有スル葉ヲ全長ニ亘ツテ疎ニ生ズル。小葉ハ略橢圓形デ表面ハ無毛デアルガ、下面ハ伏毛ヲ有シ、全體青白色ヲ帶ビ、中央小葉ハ他ヨリ稍大形デ長サ 1.8 cm 幅 1.3 cm 位アリ、小葉柄ヲ有スル。長イ總梗ヲ上方ノ葉腋カラ直立シテ生ジ、ソノ先端ガ短ク 2 岐シテ 5-10 個ノ白又ハ極淡黄色ノ花ヲ群生スル。萼ハ披針形デ外面ニ毛ヲ散生シ、先端ニ短毛ノ束ヲ有スル。コノモノハパラオ群島ノコロール島ノ路傍ニ數年前カラ逸出シテキタガ、段々ト分布ガ擴ガツテ來ル様デアリ、最近ハ東京文理科大學學生渡部景隆君ニヨツテマリアナ列島ノテニアン島デモ採集サレタ。調べテ見タ結果ブラジル原産ノ下ノ學名ノモノト判ツタ。恐ラク他ニ有用植物ノ輸入ニ伴ツテ入ツテ來タモノデアラウ。葉ノ状態ガ一見 *Lespedeza* 屬ノ一種カ又ハ *Desmodium* 屬ノアルモノヲ想像サセルノデ、**はぎかたばみ**ト稱スルコトニシタイ。

Oxalis bahiensis PROGEL in MARTIUS, Fl. Brasil. XII-2, 501, t. 105, f. 1 (1877); KNUTH, Oxalidaceae in ENGLER, Pfl.-reich, IV-130 (Heft 95) 60 (1930).

Nom. Jap. *Hagi-katabami* (nov.).

Spec. exam. Micronesia, Palau, ins. Korrer (leg. T. TUYAMA, Aug. 1937); Mariana, ins. Tinian (leg. K. WATANABE, Jan. 14, 1941).

Planta brasiliensis in Micronesiam introducta.

コノ *Oxalis* ハ小葉ガ掌狀ニ配列セズニ中央小葉ガ明瞭ナ柄ヲ有スルコトニヨツテ、我々ニ親シイ *Oxalis* ノ類ト異ルモノデ *Thamnoxyis* ト言フ節ニ屬スル。昔ハ獨立屬トシテ取り扱ハレタコトモアル。100 種以上ガコノ節ニ屬スルガ、スベテ西印度カラ中米、熱帯南米、北米南部ニ分布スル。コレラノ中 1 種 *O. Barrelieri* L. ハジャバニ輸入サレテ野生化シテキルコトガ判ツテキルガ、コノモノハヨリ大形デ紫色ノ花ヲ有スル。