

intense viridia subtus glaucina utrinque glaberrima, nervis 13-15, textu chartacea.

Haec species *Shibatea chinensis* affine, sed ex quo foliis amplioribus basi saepe subcordatis textu rigidioribus, culmis humilissimisque bene distinguenda.

Hab. China-mediana prov. Kiangsi, P'êng-chê, Nangwa-wan (彭澤縣南瓜灣)
(F. MAEKAWA no. 11M539-Dec. 1941—Typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo.)

とうおかめざき (*S. chinensis* NAKAI) ハ浙江省東北部ト江蘇省ノ南部トニ分布シテ居ル。ソレニ較ベテ丈ハ極メテ低ク僅カニ高サ 20 cm ニ滿タズ、葉ハ一層剛ク且ツ潤ク基脚ハ淺心形ニサヘナルノデ區別出來ル。今一種安徽省ノ南部ニ分布スルモノガアツテコレハ REHDER 氏ガ Journ. Arnold Arboretum 8: 91 (1927) ニ記ストコロデハ高サ 2m トアリ、御江久夫氏ガ本誌 14: 549 (1938) デ葉裏ニハ有毛ナル旨ヲ述ベテ居ラレル、安徽黃山ノ南麓ノ休寧縣カラ記載サレタ *Shibatea hispida* McCURE ナルハ多分コレデアラウガ今原記載ガ讀メナイノデ確言ハ出來ヌトシテモ本種デナイコトハ言ヘル。今回ノ產地ハ本屬トシテ分布ノ西限ニナルガ將來ハ湖北湖南邊リカラモ見出サレルカモ知レヌ。

終リニ色々御世話ニナツタ御江久夫氏ニ感謝スル。

○やまもゝトふともゝノ語源ニツイテノ新考 (前川文夫)

やまもも (*Myrica rubra* S. et Z.) ノ支那名ハ楊梅デアル。コノ漢字ガ日本ノ記録ニ現ハレタ最初*ハ出雲風土記ノ意宇郡ト大野郡ノ記事デ、コレハ元明天皇ノ御宇デアル。又少シ遅レテ、續日本紀卷 32、光仁天皇寶龜四年正月ノ條ニ「設齋於楊梅宮」同年三月ニハ「造作楊梅宮、至是宮成…是日天皇徙居楊梅宮…」猶ホ同年六月ニハ「楊梅宮南池生蓮一莖二花」等ノ記事が見出サレル。以上ハ楊梅ノ發音ニツイテハ記シテ居ナイガ、醍醐天皇ノ御宇ニ出タ本草和名ニハ也末毛毛 (但シ楊梅ノ文字ヲ記サヌ)、和名類聚抄卷九ニハ楊梅、夜末毛毛トアルノカラシテやまももト訓ダモノト背カレル。サテやまももノ語源ニハ大體三説アル。其一ハ新井白石ノ東雅カラ系統ヲ引ク山もも説で、やまハ栽培品デナイ、山地生ノ意、もゝハ丸イ果實ノ意デアル。同書ニハ「其形の桃に似たるにもあらずしかるをモモをもて呼ぶ事は凡果のその肉核をつゝみて核の中仁あるものを皆モモといひし也」ト述ベテ居ル。寺島良安ノ和漢三才圖繪モコレト大同小異デアル。牧野富太郎先生モ日本植物圖鑑 (昭和 15 年) 669 頁ニコノ説ヲ採ツテ居ラレル。第二ハ屋代弘賢ノ古今要覽稿ニ出タ山桃説デアル。即チ同書 337 卷ニ「山中に自ら生じて味も苦みありて山生の桃に似たればしかよべり」トアル様ニソノ味が似テ居ル事カラ來タトスルノデアル。第三ハ山百首説デ、東雅ニハ古説トシテ「其樹山谷の間に生じて實又繁をもてかくいひしとみえたり」トスルモノノ系統デ、近クハ田村利親氏ガ本誌 1 卷 (298) 頁 (大正 7 年) ニ百々ハモト訓ジ果實ガ多ク房ヲナシテ密集スル狀ヲ云フトシテ居ルノモコレト同ジ考察デアル。以上ヲ通ジテ見ルトやまニツイテハ皆山地生ノ意トシテ居テ共通デアルガ、自分ハコレヲ楊梅ノ支那音ノ轉訛ト考ヘタイノデアル。一體やまももハ上記ノ

* 上村六郎：やまもも考 (本草第 11 號 昭和 4 年)。

様ニ古クカラ知ラレテ居リ漢字モ宛テラレテ居ル。シカモ古今要覽稿ニ云フ様ニ「古くより何國にてもやまも」と呼て別に方言もなし云々」ナノデアアル。コレハ支那カラ楊梅ノ名稱ト利用法トガ輸入サレタガ名ガナイ。ソコデ楊梅ノ支那音ヲソノ儘探ツテ Yam-mei トイフ丸イ實ノ意味デ Yam-mei-momo → Yama-momo トナツテ各地デ通用スルニ至ツタノデハナイカト考ヘルノデアアル。

てんにんくわ科ノ果實ニふともも (*Eugenia Jambos* L.) ガアル。支那名ハ蒲桃デアツテ、從來和名ノ語源ニツイテハ聞カナイガ、コレモやまも」と同ジク蒲桃ノ支那音ヲソノ儘ニ Pu-tou トイフ Mo-mo デ Huto-momo トナツタノダト思フ。

○おほはりみ (原 寛)

おほはりみハはりみノ通常形ニ比シ大形デ丈高く莖太ク、小穂ハ大キク長サ 6-10 (-15) mm (はりみデハ 3-8 mm) 往々圓味アリ、鱗片ハ圓頭、瘦果モ少シク大、長サ 1.2 mm 許 (はりみデハ 0.8-1 mm)、花柱基ハ幅廣ク略正三角形ヲナシ、鬚體ハ通常瘦果ヨリ長キモ花柱基ノ先端ニハ達セズ小逆刺アルカ稀ニ平滑デアアル。コレハ本州、四國、九州、朝鮮南部ヨリ支那 (江蘇省) ニ迄分布シテ居ル。SVENSON (1939) ハ *Heleocharis Maximowiczii* ヤ *Scirpus japonicus* var. *thermalis* ガ同一カモ知レスト書イテ居ルガ、コレハ植物學雜誌 52 卷 348 頁及ビ本誌 16 卷 262 頁ニ述ベタ様ニえぞはりみデアリ、おほはりみトハ異ル。はりみニモ可成リノ變異ガアル事モ既ニ述ベタ通りデ、莖ガ丈高く小穂・瘦果ガ稍大形トナツタ形ハおほはりみニ頗ル似テクルガ、おほはりみヨリハ瘦果小サク花柱基ハ幅狹ク略長三角形デ、鬚體ハ花柱基ヨリ稍超出スル點デはりみノ一形¹⁾ト見做スベキモノト思フ。SVENSON ハ *E. pellucida* はりみノ記事中デ、*E. pellucida*, *E. affliata*, *E. Thomsonii* ハ小形ノモノデ、コレハ長サ 1.5 mm ニ達スル瘦果 (花柱基ヲモ含メタ長サナラン) ヲモツ大形ナ *Scirpus attenuatus* FRANCH. et SAV., *E. ochrostachys* BOECKL. ヤ臺灣産標本 (FAURIE in 1914) ニ移リ行き、更ニ印度ノ *E. congesta* ニ連絡スルト思フ旨述ベテ居ル。コソ内印度カシヤ産ノ *E. ochrostachys* ト臺灣北斗産ノ標本 (FAURIE, Nov. 1914) ハ Gray Herbarium デ實見シタガ、共ニ上記はりみノ大形ノモノデアツタ。横須賀産ニ基イテ記載サレタ *Scirpus attenuatus* ハ中井先生ガ巴里博物館デ原標本ヲスケッチサレタノヲ拜見スル事ガデキ、又原記載ヲ注意シテ讀ンデ見ルトソレガ疑ナクおほはりみデアアル事ガ分ツタ。はりみニモ上述ノ様ナ著シイ變化ヲ認メルガ、おほはりみハ矢張り別種トシテ區別シタイ。從ツテソノ學名ハ *Eleocharis attenuata* (FR. et SAV.) HARA トスベキデアアル。印度ノ *E. congesta* D. DON ハおほはりみヨリ

1) *Eleocharis pellucida* PRESL f. *elata* HARA, f. nov.

Culmi ad 30 cm alti. Spiculae 6-10 mm longae. Achenia ca. 1 mm longa. Subspecie *E. attenuatae* simillima, sed achenio paullo minore, stylopodio anguste triangulare, setis stylopodio superantibus differt.

Hab. Honsyu, Sikoku, Kyusyu, Formosa et India.