

タ。尙臺灣ノ *Anthoxanthum formosanum* HONDA ヤ比島ノ *Anthoxanthum luzoniense* MERR. ハ結局同ジモノデアルトノコトヲ廣義ニ解スレバ次ノ通り扱フベキデアラウトノコトデアツタ。

Anthoxanthum japonicum HACK. var. *sikokianum* OHWI = *A. luzoniense* MERR.
= *A. formosanum* HONDA = *A. sikokianum* OHWI.

何レ大井博士ヨリ後日詳細報告サレル機會モアラウガ差當リ小生ヨリ報告シテファイテハトノコトデアツタノデ此處ニ發表シタ次第デアル。

○すぢぬまはりみ九州ニ産ス (土井美夫)

大井博士ガ濟州島品ニ基ヅイテ發表サレタすぢぬまはりみガ薩摩國伊集院町ニ産スルコトガ明ニナツタノデ此處ニ報告スル。コノモノハ大隅・日向兩國ニモ亦産スルガ恐ラク九州本土ニハ諸處ニアルコト思ハレル。或ハぬまはりみト混同サレテキルノデアアルマイカ、筆者ハ10年位モ前カラ南九州デぬまはりみトサレテキタモノニ就テ莖ニ稜線ガアルノデ疑問ヲ抱イテキタ。先年好標品ヲ得大井博士ノ同意ニヨツテ上記ノモノト判明シ疑問ヲ解決スルコトガ出来タ。

Heleocharis valliculosa OHWI in Acta Phytotax. et Geobot. II, 29 (1933).

Nom. Jap. *Sujinumaharii*.

Hab. Japonia: Kiusiu. Ijuinmachi, Prov. Satsuma (Leg. Y. Dor, Anno 1940).

Dist. ins. Quelpaert et Seoul.

A. new addition to the flora of Japan proper.

○若林重道氏大隅・日向兩國採集品 (土井美夫)

昨年8月宮崎高農學科三年ノ若林重道君ガ來訪セラレ此兩三年間日向・大隅兩國デ採集シタ多數ノ標本ヲ持參同定ヲ求メラレタ。中ニ數品分布上面白イモノガ新ニ知レタノデ次ニ記スコトニスル。

i やまはんしようづる 昭和16年10月大隅國高隈山南側デ採集、筆者ハ先年九州本土ニ於テ本種ノ分布ニ就テ記シタガ九州本土東側デハ最初ノ記録デアル。若林君ニヨルト唯一株樹林伐採後ノ草原地ニアツタトイフ。九州本土デ依然稀産ノモノデアル。

ii むらさきむえふらん 前種ト同期日ニ高隈山デ採集、若林君ニヨルト日向國ニモ諸處ニ産スルトイフ。コレデ本種ハ紀伊・日向・薩摩・大隅(屋久島)諸國ト分布範圍ガ大分廣ク知ラレテ來タ。四國ノ南部ニモ發見ガ期待サレル。

iii のびねちどり 本種ハ九州デハ未記録ノヤウニ思ハレルノデ此處ニ報告スル。産地ハ日向國西北部ノ自岩山1000m前後ノ邊デ昨年5月若林君ノ採集ニ係ルモノデアル。

Neolindleya camtschatica NEVSKI in Fl. URSS. IV, 646 (1935).

Nom. Jap. *Nobine-tidori*.

Hab. Japonia: Kiusiu. Mt. Shiraiwayama, Prov. Hiuga (Leg. S. WAKA-