

植物研究雜誌

THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY

第十九卷 第十一號 (通卷第二百七號) 昭和十八年十一月發行


地衣類雜記 (其二十四)

朝比奈泰彥

Yasuhiko ASAHINA: Lichenologische Notizen (XXIV).

56) *Baeomyces* (sect. *Sphyridium*) *aggregatus* ASAHINA, sp. nov.

Thallus epiphloeodes, squamulosus, glaucescens, late expansus, squamis 0.20–0.35 mm latis, irregulariter crenulatis, in centro contiguus vel plus minus imbricatis, in ambitu pauce dispersis, sorediis isidiisque destitutus, ad substratum protothallo (hyphis albidis) adhaerentibus; gonidia protococcoidea, globosa, 10–12 μ lata, vulgo conglomerata. Podetia curta, 1.0–1.5 mm alta, carneopallida, nuda, in strato medullari gonidiis solitariis, cellulis 20–24 μ

Fig. 105. *Baeomyces aggregatus* ASAHINA. Habitus-Bild 1/1 全形自然大

latis vel gonidiis conglomeratis, cellulis minoribus praedita; apothecia semi-globosa, 0.3-0.5 mm lata, juvenilia solitaria demum botryoso conglomerata; discus testaceo-badius, subnitidus, margine excluso; hymenium ca. 90μ altum, pallide fuscescens, jodo asci tantum coerulescentes; hypothecium incoloratum; paraphyses filiformes, simplices vel pauce ramosae, obsolete septatae; asci clavati, apice incrassati; spores 8-nae, simplices, decolores, applanato-oblongae, 11-16 μ longae, 4 μ latae. Conidia non visa. Ad corticem *Cyptomeriae japonicae*.

React. Thallus K+flavens, PD-. Atranorinum, acidum didymicum et acidum ignotum continens.




Fig. 106. *Baeomyces aggregatus* ASAHINA.

- a. Schematisches Bild eines Apotheciums. 子器模型圖
b. Paraphyses und ein Askus mit Sporen. 側絲並=子囊

本種ノ葉體ハ微小ノ灰綠色鱗片狀顆粒デ基物ニ密着シ稀ニ屋瓦様ニ排列スル所モアル。裂芽モ粉芽モ生ジナイ。ゴニデア」ハ球形デ互ニ密着シ團塊トナル。子柄ハ極メテ短ク、幼稚ノモノハ單一ノ子器ヲ戴クガ、生長スルニ随ツテ分裂シテ10箇位ニ増加シ累々トシテ葡萄果房狀ニナル。子柄ノ縦斷面ヲ見ルト、髓層ハ比較ノ太イ菌絲カラナリ時ニ中央部ガ割レテ空隙ヲ生ジテ居ル、コレハ多數ノ子器ノ發生ニ伴フテ異常ノ張力ヲ生ズル爲デアロウ。又稀ニ此髓層内ニ綠顆粒ノ點在スルヲ認メルガ、其形狀ハ葉體內ノ「ゴニデア粒ニ比シ徑ガ2倍モ大キク且ツ内容物ハ殆ンド老廢シテ居ル、又時ニ「ゴニデア團塊ヲ見ルコトガアルガ其各細胞ハ殆ンド空虛デアアル。何レニシテモ、子柄ノ髓層中ニ「ゴニデア粒ヲ含ムコトハ本種ガ *Sphyridium* 亞屬ノモノデアアルコトヲ示スデアアル。子囊層ハI-溶液ヲ注グト子囊ノミガ藍色トナリ絲狀體ヤ粘液ハ染マラナイ。胞子ハ長橢圓形、單室デアアル。

現在迄=知ラレテ居ル産地ハ越中立山ブナ坂ノ杉ノ巨木皮上(橋本亮)ト屋久島(大株、花ノ江川)デ同ジク杉皮=着生シテ居ル(藤川福二郎)。

本種ノ代謝産物ハ複雑デ凡ソ3種ノ物質ヲ認メル、即チ葉體並=若干ノ子器ヲ硝子板上デ「アセトン」ヲ滴下シテ浸出シ、溶媒ノ自然蒸發=ヨリ殘留スル「エキス」ヲ「デッキ硝子ノ下デ G.E. 液ヲ加ヘテ加熱シ溶解サセテ放冷スルト3通りノ異ナツク結晶ガ現ハレル。

(1) **アトラノリン** 細微ナ無色ノ柱狀晶デ其形狀カラ見テモ、又ハ別ノ「アセトン・エキス」= o-T 試藥ヲ加ヘテ生ズル芒穂狀ノ黃色結晶絲ノ生成カラ見テモ「アトラノリン」=間違ナイ。

(2) **ヂヂム酸** 長大ナ無色ノ柱狀晶デ先端ハ直角或ハ斜=切ラレ所々カラ枝ヲ出ス様=集合シテ居ル。又アセトン・エキスノ他ノ一部ヲ G.A.W. 液カラ再結晶スルト極メテ細イガ長イ針晶ガ現ハレル。兩方共=斜消光デ消光角 ϕ ハ約 40° (回轉ノ方向ガ違ヘバ其餘角約 50°) フ示シ、ヂヂム酸ガ豫想サレタノデ「アセトン・エキス」ノ他ノ一部ヲヨク乾燥シ略々同量ノ漂白粉ヲ混和シ、之ニ酒精ヲ一滴加ヘルト暫クシテ綠色ニナル。是等ノ反應ハ「ヂヂム酸ト判定スルニ充分デアル。尙此機會ニ「ヂヂム酸ノキノリン鹽ヲ「デッキグラス」ノ下デ結晶サセルコトニ成功シタ。先ヅ純粹ノ「ヂヂム酸ノ極メテ微量ニ G.A.Q. 液ヲ滴下シ「デッキグラス」デ覆ヒ放置(加温シテハイケナイ)スルト、暫クシテ放射狀ニ集合シタ無色ノ針晶又ハ柱狀晶ガ現ハレル。本種ノ「アセトン・エキ




Fig. 107. Stoffwechselprodukte von *Baeomyces aggregatus* umgelöst aus G.E.-Lösung.

a. Atranorin. b. Didymsäure. c. eine unbekannte Säure.

ス」ヲヨク乾燥シコレニ G.A.Q. 液ヲ加ヘルト、初メハ油狀トナルガ約一夜ヲ經過スルト「アトラノリン」ノ「ヒノリン鹽」¹⁾ト同時ニ無色ノ放射狀ニ集合シタ針晶(時々弧曲スル)ガ現レル。其形ハ純粹ノ「ヂヂム酸カラ出タモノト全く同一デアル。此場合ニモ熱ハ加ヘテハイケナイ。

3) 不明ノ酸 G.E. 液カラ現ハレル第 3 ノ物質ハ雪ノ結晶ノ様デ輪廓ノ不整ナモノヤ雲形ノ輪廓ヲシタ曇ツタ結晶デ、G.A.W. 液カラ再結晶ヲスルト樹枝狀或ハ花火ノ流星ノ様ナ形デ現ハレル。カクノ如キ結晶ハ地衣ノ脂肪系酸ガヨク現ハスモノデアルガ純粹ノ物質ヲ分離シナイカラ斷定ハデキナイ。然シ此ノ 3 種ノ結晶ガ微量法デ同時ニ出現スルコトハ本種ノ判定ヲ實ニ簡易ナラシムルト云ハネバナラナイ。

57) *Baeomyces* (sect. *Sphyridium*) *sanguineus* ASAHINA, nov. sp.

Thallus crustaceus, epilithicus, late expansus, lineis protothallinus non limitatus, uniformis, plus minus granulosus, vulgo rimoso-diffractus, ca. 0.25 mm crassus, partim cinereus partim sanguineo-rubescens; stratum corticale non evolutum, stratum medullare crebre contextum, in parte superiore materia rubra granulata crystallisataque crebre inspersum, in parte inferiore crystallis calci oxalati abundanter praeditum; gonidia protococcoidea, cellulis globosis, 8.5–11.0 μ latis. Podetia teretia, solida, curta, 0.5–1.0 mm alta, 0.3–0.5 mm crassa, carneo-rubentia, strato gonidiophoro haud obducta; stratum medullare podetiorum ex hyphis dense contextis formatum, in parte inferiore gonidia protococcoidea perpauca continens, interdum etiam algas Gloeocapsoideas fortuito continens. Apothecia solitaria, orbicularia, 1.0–1.5 mm lata, discus primum planus, margine paulo prominulo demum convexus, carneus vel sanguineo-rubescens; stratum corticale excipuli podetiorumque pseudo-parenchymaticum, ex hyphis horizontalibus, cellulis minutis, 5 μ longis, 3 μ latis formatum; hymenium dilute testaceum, ca. 70 μ altum, I–, materia rubra granulata crystallisataque dense inspersum; hypothecium hymenio concolor, ca. 25 μ crassum, utroque materia rubra disseminatum. Paraphyses filiformes, apicibus haud incrassatis. Asci subcylindrici, apice incrassati, sporae 8-nae, subbiserialae, oblongae, rectae vel curvulae, 8–13 μ longae, 4 μ latae. Conidangia non visa. Ad saxa in monte Formosae.

React. Thallus cinereus K+flavens, mox sanguineo-rubescens, PD+lutescens. Acidum norsticticum et materias rubras continens.

1) 本誌 第 XVI 卷 第 192 頁 (1940)

var. **ablutum** ASAHINA, nov. form.

Thallus cinereus, non rubricosus-tinctus. Apothecia carneo-sanguinea, in hymenio et in parte exteriori podetiorum materia rubra granulata crystallisataque inspersa. Ceterum ut in typo. Ad saxa in montibus Tosa (Sikoku).

本種ヲ一見シテ奇異ニ感ズルコトハ葉體ノ大部分ト子器トガ血赤色ニ染マツテ居ルコトデアル。葉體ガ灰色デアル部分ト其處ニ生ズル子器ノ形丈ケヲ見タノデハ *Baeomyces brevis* ト殆ド區別ガツカナイ。然シ此場合デモ子器ノ盤ハ明ニ赤色デアル。又代謝産物ハ *brevis* デハ「スチクチン酸デアルニ對シ本種デハ」ノルスチクチン酸デアル。尤モ此兩酸ハ同一種ノ中デ共存スル例ハ少クナイ（例ヘバ *Lobaria pulmonaria*, *Stereocaulon* spp.）。歐洲産ノ *Baeomyces rufus* デモ K+黄→赤色ノ反應アルモノヲ變種ニシテアルカラ或ハ本種ガ *B. brevis* ノ變種ノ様ニモ考ヘラレル。但シ *brevis* ノ子柄ヲ縦斷シテ鏡檢スルト、其髓層中ニ多數ノ大形球形ノ藻細胞ヲ容易ニ見ルコトガデキル (*Sphyridium* 亞屬ノ特徴) ケレドモ、本種ニアツテハ子柄ノ髓層中ニハ葉體中ニアル「ゴニデア」ト同形ノ藻細胞ハ中々見付カラナイ。然シ基部ノ方ヲヨク見ルト、極メテ少數デハアルガ「ゴニデア」ト同形ノ藻細胞ガアリ、少シ上部ニ行クト其形ガ崩レ帶黄色ノ内容物ヲ殘スニ過ギナイ。兎ニ角子柄ノ髓層中ニ「ゴニデア」ヲ認メ得ルコトハ本種ガ *Sphyridium* 亞屬デアルコトヲ物語ルモノデアル。コレト同時ニ時々 *Gloeocapsa* 型ノ群落が見ヘルガコレハ恐ク偶然ノ機會ニ基物ト地衣體トノ接觸面カラ入り込ダモノデアロウ、WAINIO (Lich. Insl. Philipp. III, p. 57) ハ *B. fungoides* デ同様ノ事實ヲ認メテ居ル。然シ生態的ニハ髓ニ頭狀體 (Cephalodium) ノ一型ト云ハネバナナルマイ。

本種ノ反應ハ灰色ノ葉體表面ニ Kヲ注グト初メ黄色デ直ニ血赤色ニ移行シ、顯微鏡下デ赤色ノ細針晶ノ析出ヲ認メルコトガデキル。此「ノルスチクチン酸」ノ反應ハ赤色ニ染ツク部分デハ元カラアル色素ニ妨ガラレテ明瞭デナイ。此元カラアル色素ハ組織ノ中ニ顆粒又ハ不完全ノ結晶體トシテ或ハ密ニ或ハ粗ニ點在シテ居リ、Kヲ加ヘテモ暗紅色或ハ紫紅色ニ移行シナイカラ「ロドクラドン酸」ノ如キ「アントラヒノン系」ノ化合物デハナイ。一ツノ想像ハ本種ノ代謝産物デアル「ノルスチン酸」ガ石灰ト結合シタモノデハナイカト云フコトデアル。現ニ本種ハ髓層ノ下方ニ蓆酸石灰ヲ多量ニ析出シテ居ルカラ石灰ヲ蓄積スル作用ノアルコトハ明デアル。一方ノルスチクチン酸ヲ苛性石灰ト「デッキ」硝子ノ下デ接觸サセルト、緩漫デハアルガ赤色ノ化合物ガデキルコトハ實驗デ確メラレク。

以上ノ基本種ハ緒方正資氏ガ臺灣臺北州屈尺デ採集シタモノデアルガ、藤川福二郎君ガ土佐國安藝郡安倉デ採集シター標本ハ全體ノ構造ガ殆ンド全ク屈尺産品ト同一デアルガ葉體ハ灰色デ血赤色ニ染マツテ居ナイ、之ヲ *var. ablutum* ト呼ブ。




Fig. 108. *Bacomyces sanguineus* ASAHINA.

- a. Durchschnitt des Thallus, g—gonidien. 葉體縱斷面
 b. Gonidien und Oxalat-krystallen (k) im Quetschpräparat. 壓擦標本=見ル
 「ゴニデア」ト蓆酸石灰晶




Fig. 109. *Bacomyces sanguineus* ASAHINA.

- a. Längsschnitt eines Apotheciums. 子器縱斷
 b. Randpartie eines Apotheciums im Längsschnitt. 子器縁部ノ縦斷
 c. Askus und Paraphyse. 子嚢及側絲
 k. Rote Substanz. 赤色物質

58) 日本産せんじんごけ屬ノ目録 (*Baeomyces*-Arten aus Japan).

MÜLLER ARG.¹⁾ハ既ニ 1862 年ニ *Baeomyces* 屬ノ小區分トシテ *Eubaeomyces* ト *Sphyridium* ノ 2 亞屬ヲ置タガ、1918 年ニ WAINIO²⁾ ハ子柄ノ表面ニ「ゴニデア塊ヲ被ルモノト然ラザルモノトデ *Phloeopus* ト *Gymnopus* ノ 2 節ヲ設立シタ。ZAHLEBRUCKNER モ *Pflanzenfamilien* 第 2 版ニ於テ WAINIO 式ヲ採用シタ。然シコノ性質ハ程度問題デアツテ、節ノ特徴トシテハ薄弱デアルコトガ判リ養成者ヲ失ツタ、³⁾ 1932 年ニ E. FREY⁴⁾ ハ *Baeomyces* 屬ノ小區分ヲ批判シ、子器ノ原始組織ガ基本葉體ノ内部ニ發生スルモノハ子柄ノ髓層ニ「ゴニデア」ヲ含マズ、又同ジ組織ガ葉體ノ「ゴニデア層カラ發生スル場合ニハ子柄ノ髓層ニ「ゴニデア」ヲ散見スル事實ヲ基礎トシ、MÜLLER ARG. ノ兩亞屬ヲ復活サセタ。最近佐藤正己氏⁵⁾ガ日本産 *Baeomyces* 屬ヲ記述スル際モ此ノ FREY 式ニ據ツタノデ現在デハ最モ合理的デアルト思フ。但シ各ノ種ノ配合ニツイテハ佐藤氏ト多少ノ意見ノ相違ガアルノデ、代謝産物ノ記録ト一所ニ再ビ此問題ヲ取り上ゲタ次第デアル。

***Baeomyces* PERSOON**

Subgenus *Sphyridium* MÜLL. ARG. ex FREY in RABENHORST's Kryptogamen-Flora, ed. II, Bd. IX, Abt. IV/1, p. 33; SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌，第 7 册，p. 14.

(1) *Baeomyces rufus* REBENT.—ZAHLEBR., Cat. Lich. Univ. IV, p. 419; SATÔ, l. c. p. 17.

React. Thallus et podetium K+ leviter flavens, PD+ fulvescens.

Acidum sticticum continens.

FREY (l. c.)ハ歐洲産ノ本種ヲ 2 變種 5 品種ニ分ケテ居ル。其變種ノ一ツ var. *carneus* ト其品種 f. *fuscoringens* トハ葉體モ子器モ K+黄色→血赤色デアリ、又他ノ變種ノ var. *callianthus* ハ葉體ハ K+黄色ニ止マルガ子器ガ K+黄色→赤血色ニナルコトデ標準形ト區別サレテ居ル。此兩變種ハ本邦ニハマダ見出サレナイ。元來 *B. rufus* ハ「ステクチン酸ヲ代謝産物トシテ居ルカラ K = 對シテハ黄色又ハ淡黄褐色ノ程度デアル、然シ「ステクチン酸ヲ含ムモノ

1) Mémoir. Soc. Phys. et Hist. nat. Genève 16, p. 364 (1862).

2) Lich Insul. Philipp., III, p. 57 (1918); Acta Soc. Fauna et Flora Fennica, Bd. 53, p. 4 (1922).

3) Vergl. Tobler, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 46, p. 220 (1828).

4) RABENHORST's Kryptogamenflora, IX, Abt. IV, Lief. 1, p. 25 (1932).

5) 中井、本田：大日本植物誌 No. 7, p. 8-25 (1941).

ハ屢、其ノ脱メチル化合物デアル「ノルスチクチン酸ヲ同時ニ生成スルコトハ
かぶとごけやきごけデ吾々が經驗シテ居ルコトデアルカラ、若シ var. *carneus*
ヤ *f. fuscorufescens* ガ形態の = *rufus* = 一致スルナレバ、恐ラク此場合モ共
雜スル「ノルスチクチン酸ノ爲ニ K+血赤色ヲ呈スルモノデアロウ。然シ予
ハ未ダ此兩品ニ接シナイカラ確言ハデキナイ。予ノ所持スル邦産ノ *B. rufus*
標本ハ何レモ「スチクチン酸ノミヲ含ンデ居ルシ又歐洲産ノ標本モ同一デアツ
タ。要スルニ K 反應一點張りノ FREY ノ分類ハ茲デハ正確ヲ缺クモノト思
フ。又佐藤正巳氏ガ邦産ノ *Baeomyces* 屬ノ地衣ノ大部分ガ PD+赤褐色デ「フ
マールプロトセトラール酸ヲ含ムト云ツテ居ルノモ間違デ、スチクチン酸ノ
PDニヨル呈色(黄褐色或ハムシロ稍、赤味ノアル酸化鉛ノ色)ヲ「フマール
プロトセトラール酸ノ朱紅色ノ呈色ト混同シタノデアル。

日本カラハ NYLANDER (Lich. Jap. p. 17) ガ *B. rufus* var. *subsquamulosus*
NYL. ナルモノヲ記録シテ居ルガ、余ノ標本 17 箇ノ内コレニ合致スルモノハ
僅ニ 1 箇デ、アトハ標準型ト *f. rupestris* HARM. トガ半分宛デアル。

標準型 (pl. *typica*). 本來ハ地上生デアルガ時々岩石上或ハ木片上ニモ生ジ、
ソレ等ノ代表者ハ皆予ノ乾園中ニ存在シテ居ル。鱗片ハ 1 mm 前後デ時ニ粉
芽化シテ居ル。子柄ハ太サ 1 mm 前後、長サ 2-3 mm ニ達シ、子器モ大キク徑
2.5 mm ニ及ブモノガアル。

地上生標本産地：北海道(トムラウシ岳、松山温泉)、本州(越中有峯、富
士御殿場口)。

木片上ニ生ゼル標本産地：九州(屋久島)、本州(富士大宮口)。

岩石生標本産地：北海道(大雪山-黒岳)、本州(信濃白馬柵池、日光前白
根)。

f. rupestris HARM.—ZAHLEBR., Cat. Lich. Univ. IV, p. 424.

鱗片ハ小形 1 mm 以内デ基物ニ密着シ、子柄モ太サ 0.5 mm 高サ 1.5 mm ヲ
越ヘナイ。又子器ノ徑ハ 1 mm 前後デアル。元來岩石生デアルガ時ニ他ノ基
物上ニモ生ズル。

岩石生標本産地：樺太(瀧之澤)、北海道(トムラウシ岳)、本州(陸奥八
甲田山、日光前白根、信州八ヶ岳)。

f. subsquamulosus FREY—ZAHLEBR., l. c. p. 43.

鱗葉ハ大ニ發達シ、大サ 2×1 mm ニ及ビ間、屋瓦狀ニ排列シ、邊緣デハ多
少反卷シテ居ル。子柄ト子器ノ大サハ標準型ト同一デアルガ、子柄ハ小鱗葉
デ殆ンド覆ハレテ居ル。標本ハ信州白骨温泉産デアル。

(2) **Baeomyces brevis** ZAHLBRUCKNER in FEDDE, Repert. XXXIII, p. 45 (1933); SATÔ, l. c. p. 14.

React. Thallus et podetium K+leviter flavens, PD+fulvescens.

Acidum sticticum continens.

Im Gegensatz zur ZAHLBRUCKNERSchen Beschreibung wird das Hymenium durch Jod nicht blau, sondern hell gelb gefärbt.

本種ハ予ノ臺灣阿里山採品 No. 210 ヲ基礎トシテ ZAHLBRUCKNER ガ新種トシタモノデ、一見 *B. rufus* f. *rupestris* = 酷似シテ居ル。然シ葉體ハ大體ニ於テ痂狀デアアル、但シ龜裂ガアルカラー一寸鱗片ノ様ニ見ヘルガ決シテ屋瓦狀ニ排列セズ。又邊緣ガ卷キ上ルコトナク基物ニ密着シテ居ル。又子器ノ盤ハ *rufus* ノソレヨリモ濃厚ニ暗褐色デアアル。又 ZAHLBRUCKNER ガ *rufus* トノーツノ差違トシテ擧ゲタ子囊膺 I+ 藍色ノ反應ハ誤リデ、*rufus* 同様 I- デアル。予ノ所持スル標本ハ皆岩石生デアアル。現在デハ臺灣阿里山ノミカラ知ラレテ居ル。

(3) **Baeomyces placophyllus** (LAM.) ACH.

ZAHLBRUCKNER, Cat. Lich. Univ. IV, p. 413; SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 16 (1941).

ASAHINA, TANASE u. YOSIOKA, Ber. deutsch. chem. Ges. 69, p. 125 (1936).

React. Thallus et medulla K+flavens, PD+fulvescens. Acidum sticticum continens.

本種ハ本亞屬中葉體ノ最モ發達シタモノデ、大キナ葉片ガ基物上ニ擴ガツテ居リ、又子柄モ長大デ「ゴニデア」ノアル皮膜ガアル。成分ハ「ステクチン酸」デソレニ相當スル呈色反應ヲ現ハス。

標本產地 本州：越中（眞川）；日光（湯本）；武藏（秩父）；相模（箱根、二子山、神山）。四國：伊豫（石槌山）。九州：屋久島（花ノ江川）。臺灣（阿里山）。

(4) **Baeomyces botryophorus** ZAHLBR. in FEDDE, Repert. XXXIII, p. 45 (1933); SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 21 (1941).

React. Thallus et podetium K+lutescens, mox sanguineo-rubescens, PD+intensive lutescens. Acidum norsticticum continens.

本種ノ原記載ニハ子柄ノ髓層ニ「ゴニデア」ノ有無ニツイテハ何モ唱ヘテナイ。佐藤氏ハ „全ク綠顆粒ヲ含マズ” ト明言シテ居ルガ、實ハ圖 (Fig. 110 g) ニ示ス通り綠顆粒ガアツテ確ニ *Sphyridium* 亞屬ノモノデアアル。成分ハ「ノルステクチン酸」ヲ含ミ K デ初メ黄色カラ直ニ血赤色ニ移行スル。




Fig. 110. *Baeomyces botryophorus* ZAHLEBR.
Längsschnitt des Podetiums (schematisch).

臺灣阿里山ノミニテ採集サル。

(5) ***Baeomyces aggregatus*** ASAHINA.

React. Thallus K+flavens, PD-. Atranorinum, acidum didymicum et acidum ignotum continens.

葉體ハ鱗片狀デ子柄ハ短ク、子器ハ多數團塊ヲナシテ居ルコトハ極メテ顯著デアル。又成分トシテ、從來 *Cladonia* 屬ノ赤色果實節 (Cocciferae) = 主ニ出現シタ「ヂヂム酸ヲ含ムコトハ注目ニ値スル。

標本產地。屋久島、越中立山ヅナ坂。

(6) ***Baeomyces sanguineus*** ASAHINA.

React. Thallus in parte cinerea K+lutescens, mox sanguineo-rubescens, PD+lutescens, gelatina hymenialis I-, asci I+coerulecens. Acidum norsticticum et materias rubras continens.

前項記載ノ場所デ詳述シタ通り外形ハ *B. brevis* = 酷似シテ居ルガ葉體ノ一部並ニ子器ガ血赤色ニ染リ且ツ「ノルスチクチン酸ヲ含ンデ居ルノデ區別サレル。

標本產地。臺灣阿里山。

var. ***ablutum*** ASAHINA.

痂狀ヲナス葉體ハ灰色デ赤染サレナイ。然シ子器ハ赤色ニ染マル。

標本產地。土佐。

Subgenus *Eubaeomyces* MÜLLER. ARG. ex FREY in RABENHORST's Kryptogamen-Flora, ed. II, Bd. IX, Abt. IV/1, p. 33 (1932); SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 19 (1941).

(7) **Baeomyces absolutus** TUCK.—ZAHLEBRUCKNER, Cat. Lich. Univ. IV, p. 408; SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 19 (1941).

React. Apothecia K+leviter flavens vel-, PD+lutescens. Acidum baeomyeticum continens.

本種が我國ニ産スルコトハ、MÜLLER. ARG. ガ Lichenes Yatabeani, No. 6 デ日光産 no. 316 ヲ之ニ充テタ。今回マイクロ法デ本種ガ「ベオミケス酸ヲ含ムコトヲ知ツタ。

var. **stipisatus** WAIN.—SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 20 (1941).

React. Ut in typo.

(8) **Baeomyces roseus** PERS.—SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 22 (1941); KOLLER u. MAAS, Monatsh. Chem. **66**, p. 57 (1935).

React. Thallus et podetium K-vel leviter flavens, PD+lutescens. Acidum baeomyeticum continens.

本種ニ特異ノ「ベオミケス酸ガ存在スルコトハ KOLLER 及 MAAS ガ發見シタノデアルガ、其後「ベオミケス酸ハ朝比奈及其協力者ニヨツテ *Thamnozia vermicularis* ニモ出現スルコトガ見出サレタ。本酸ノ簡便ヲ證明法ハ本誌第18卷第622頁ニ掲ゲテアル。

(9) **Baeomyces fungoides** (Sw.) ACH.—ZAHLEBRUCKNER, Cat. Lich. Univ. IV, p. 411 et X, p. 379—SATÔ, 中井・本田：大日本植物誌第7册, p. 15 (1941).

Syn. *Baeomyces roseus* PERS. var. *subcomplicatus* SATÔ, l. c. p. 23.

React. Thallus et podetium K+leviter flavens, PD+lutescens.

Acidum baeomyeticum continens.

ZAHLEBRUCKNER ハ予ノ阿里山採品 No. 211 ヲ本種ト鑑定シタ。大體ハ前種ニ酷似スルガ子器ガ稍ニ長味ガアリ且ツ不整ノ褶ガアル。佐藤氏ノ *Baeomyces roseus* v. *subcomplicatus* ハ本品ニ外ナラナイ。

反應、成分ハ何レモ *B. roseus* ニ一致シテ居ル。