

= *Clematis angustifolia* JACQUIN var. *dissecta* YABE, Higasi-Moko Syokubutsu-Mokuroku 14 (1917), nom. seminud.

= *Clematis angustifolia* JACQUIN f. *breviloba* FREYN in Oesterr. Bot. Zeits. XLV, 59 (1895), LI, 374 (1901).

= ***Clematis hexapetala*** PALLAS, Itin. III-2, appendix 775 t. Q. f. 2 (1776), Voy. IV 701, Tab. XIV fig. 3 (1793).

f. ***breviloba*** (FREYN) NAKAI, comb. nova.

Area distr. Manchoukuo, Mongolia, Amur, Dahuria, Nertchinsk, Transbaical.

いとくさぼたんトイフモノハほそばくさぼたんノ葉片ガ細ク切レル一品デアリ、満洲國、蒙古、黒龍州、ダフリヤ、ネルチンスク、バイカル地方ニ分布スル。北川博士ハ故矢部吉禎ノ附シタル *Clematis angustifolia* var. *dissecta* ヲ援用シテ *Clematis hexapetala* f. *dissecta* ナル名ヲ作りシモ矢部氏ノ命名ニ先ツ 22 年 FREYN 氏ガ *Clematis angustifolia* f. *breviloba* ナル名ヲ與ヘ居ル故 *Clematis hexapetala* f. *dissecta* トスルガ正當デアル。予ハ在外研究中 f. *dissecta* ガ f. *breviloba* ト同一ナル事ヲ原標本ヲ見テ知り備忘録ト一部ノ寫生ヲシテ置イタ。

〇てんなんせう屬ハ本來二葉ノモノデアル (前川文夫)

くわんとうまむしさう (*Arisaema serratum* SCHOTT). ほそばてんなんせう (*A. angustum* FR. et SAV.). むさしあぶみ (*A. ringens* SCHOTT) 等ハ常ニ 2 葉ヲ具ヘ、外葉ノ葉柄中ニ内葉ノ葉柄ガ納マリ、内葉ノ柄中ヲ花序軸ガ貫通シテ居ルコト衆知ノ事實デアル。然ルニ又一方ニハひろはてんなんせう (*A. robustum* NAKAI). ひとつばてんなんせう (*A. monophyllum* NAKAI). うらしまさう (*A. Urashima* HARA) 等ノ如クニ 1 葉ノ柄中ヲ花序軸ノ通ヅルノヲ常態トスルモノガアル。コノ兩者群ノ相違ハ甚ダ固定シタモノノ様デアアルガ屢ニ後群ノ者ニ發育ノ悪イ第二ノ葉ヲ生ズルノヲ見ルコトガアル。最近ニモ牧野先生ハうらしまさうト *A. amurense* MAXIM. トニカウシタ 2 葉ヲ出シタ實例ヲ教示サレタ。試ミニカハルニ一葉性ノモノノ葉柄即チ偽莖ヲ縱斷シテ見ルト、葉 (即チ外葉ニアタル) ノ葉柄ノ最下部ニ包マレテ極メテ短カイ (通常 2-3 cm 内外) 筒狀ノモノヲ見出ス。質ハ軟ク薄ク貧弱デハアルガソノ上縁ハ輕イ波線ヲ呈シ、且ツ全體ガ固ク花序軸ノ基脚ヲ捲イテ居ルノデコレガ葉柄ト相同デアルコトヲ示シ、第二葉即チ内葉ノ甚ダシイ不發達狀態ト考ヘルコトガ出來ルノデアル。何等カノ原因デ——或ハ成長ホルモンナドガ關係スルカモ知レナイガ——例外的ニコノ内葉ガ發達スルガ通常ハソノ發育ガ阻止サレテ居ルノデアアル。コノ事實ニツイテハ既ニ昭和 11 年ニ東亞植物圖説 1 pl. 23 fig. c ニひろはてんなんせうヲ材料トシテ圖示記載シテ置イタカラ參照サレタイ。終リニ御教示ヲ頂イタコトヲ牧野先生ニ感謝スル次第デアル。