

l. c. = *Cyrtostachys Renda* BLUME in MIQUEL, MULDER & WENCKEBACH, Bulletin des sciences physiques & naturelles en Néerlande I, 66 (1838), in Rumphia II, 101 t. 120 (1843).

〇のはらにんじん屬ノ一新種 (北川政夫)

滿洲國興安南省王爺廟驛附近ニのはらにんじん屬即チ *Carum* 屬ノ新シイ種類ガアルノデ茲ニ發表スル。本種ハのはらにんじん (*Carum burtaticum* TURZANINOW) ヤ北支産ノ *Carum Bretschneideri* WOLFF ニ稍似タモノデアルガ葉裂片ガ極メテ細ク殆ンド絲狀ヲナシ葉面モ廣ク又莖モ高イ。全ク獨立シタ一種デアルト思ハレル。ヨツテ次ノ新學名、新和名ヲ與ヘタ。

Carum (sect. *Carvi*) *angustissimum* KITAGAWA sp. nov.

Planta perennis. Radix fusiformis indivisa fusca. Caulis simplex gracilis teres longitudine tenuiter striato-nervatus glaberrimus laevis dilute viridescens ad ultra 80 cm. altus basi 3.5 mm. in diametro superne laxo ramosus, ramis gracillimis erecto-patentibus. Folia glaberrima erecto-patentia; folia radicalia et caulina infima in florēde tempore emarcida; folia caulina longe—breviter petiolata; petiolus inferne anguste amplexicauli-vaginatus longitudine striato-nervatus ad 7.5 cm. longus; lamina ambitu deltoideo-ovata utrinque viridia ad 13.5 cm. longa 4-10-jugo-quadrripinnatisecta; pinnae pinnulaeque omnes approximatae et ad rhachim vel rhachidulam decussatae; lobis ultimis omnibus angustissime linearibus uninervatis apice cuspidato-acuminatis margine laevibus. Umbellae radii 4-13 glaberrimi gracillimi usque 4 cm. longi; involucri phylla 2-5 angustissime linearia fere setacea apice sensim attenuata anguste albo-marginata ad 12 mm. longa ad 1 mm. lata glaberrima. Involucelli phylla 4-7 anguste linearia sensim attenuata anguste albomarginata 3 mm. longa; umbellulae ±20-florae; pedicelli sub anthesin ad 8 mm. longi gracillimi glaberrimi. Flores albi. Sepala minutissima obsoleta triangulata acuta. Petala alba orbicularia emarginata apice lacinulam obtusam inflexa 1 mm. longa. Stamen 5; filamenta alba filiformia 1.3 mm. longa; antherae orbiculares apice emarginatae luteae 0.5 mm. longae. Stylopodium depressoconicum 0.4 mm. altum. Styl 2-0.5 mm. longi divaricati apice globoso-punctatostigmatosi. Meri carpia immatura tantumvisata transverse hemiteretia glabra ventre plana, jugis omnibus aequalibus nerviformibus remotis.

Nom. Jap. *Itoba-nohara-ninjo* (nov.) いとばのはらにんじん (新稱)

Hab. Manshuria:

Prov. Hsing-an, Austr. [興安南省]: in pratis circa Wang-ye-miao [王爺廟] (M. KITAGAWA Jul, 25, 1939—Typus).

Area Geogr. Manshuria occid.

Affine *Carum burtaticum* TURZANINOW et *Carum Bretschneideri* WOLFF, sed differt segmentis foliorum angustissimis fere filiformibus magis elongatis, caule elatiore gracile.