

日本産なべわりニ就テ

奥山春季

S. OKUYAMA: On the Japanese Species of *Croomia*.

なべわりハ一般ニ *Croomia japonica* MIQ. ト呼バレテ居ルガ MIQUEL ノ原記相文ヲ讀ミ、ウナヅケナイ點ガアツタカラ、各地ノ標品並ニ文献ニ當ツテ見タ處、意外ニモ草木圖説等ニ記ス中部日本産ノなべわりハ MIQUEL ノ *Croomia japonica* デハナイト言フ考察ニ違シ、ツイデニ日本産なべわり屬ヲ檢討シテ見タカラ、ソノ結果ヲ此處ニ記サセテ頂ク事ニシタ。

因ニ MIQUEL ハ原記載ノ標品ノ產地ヲ明記シテ居ラナイガ、恐ラク北九州ノモノデハナカツタカト想像スル。原文ニハ Probabiliter in regionibus australibus Japoniae トアリ、後章ニ於テ BUERGER 及ビ TEXTOR ニヨリ多數ノ標品ガ採集サレタコト及ビ PIEROT 採集ノ九州 Kawara Jama ト言フ地名ヲ擧ゲテ居ル。

私ハ九州産ノ標品ヲ檢シタ結果 MIQUEL ノ記ス様ナ花ノ單生スル形デ “Perigonii phylla anguste elliptico-oblonga” ニ一致スルモノガアル事、而シテコレハ北九州産デ、*C. japonica* MAKINO ハコノ形デアルト思フ。南部産ハ多少形ヲ異ニシ、一花梗ニ 2-4 花ヲツケル。シカシ南ニ行クニ從ツテ葉ノ數モ多クナリ大隅ノ大島産ノモノデハ草丈モ高く 12 枚ヲカゾヘルモノモアリ、葉脚ハ心臟形ヲナス傾向ガ強イ様デアル。花梗上ノ花數ニツイテ見レバ 1 花ヲツケルモノカラ 3-4 花ノモノマデ續イテ居ル様ニ考ヘラレル。然シ北九州ノモノハ上述ノ如ク概ネ單生デ從來ノなべわりト同様デアルガ花被片ノ兩縁ガ外卷シ標品ニスレバ長橢圓形狀ヲ呈スル。私ハ MIQUEL ノ *japonica* ハコノ花ノ單生スル花被片ノ狭イ北九州ノ形デアルト斷ズルモノデアル。而シテ 2-4 花ヲツケル南九州ノモノハ北九州ノ形ト種ハ同ジダト思フケレドモ、地理的ニ區別出來ル様デアルカラ var. *kiusiana* (MAKINO) ト呼ンデモヨイト考ヘル。コノ場合花ノ單生スル MIQUEL ノ *C. japonica* ヲなべわりもどきト呼ブコトニシタイ。因ニなべわりニ於テモ花梗ガ兩岐スルモノノアル事ハ飯沼翁ノ草木圖説ノ中ニ記シテ居ラレル。私ハ阿波産ノ標品ヲ實見シタ。

次ニ從來ノなべわりハ何かト言フ問題デアルガ、コレハ BAKER ガ 1877 年 (明治 10 年) *Journal of Botany* ニ於テ發表シタ *Croomia japonica* var.

heterosepala BAKER = 當ルモノト考ヘル。原品地ハ Kiga デアル。Kiga ハ 松村博士ノ植物名鑑ニヨレバ相模トアルガ、地名辭典ヲヒクト神奈川県足柄下郡木賀ト出テ居ル。即チ箱根デアル。相模以南ノ本州及ビ四國ノ標品ハ草木圖説ニ記スなべわりニヨク一致スル。

なべわりノ花被片ハ最外片ノミ特ニ大形(然シ略シ4片トモ同長ト云ヘル形モ見受ケル)デ卵圓形、長1cm許アリ、他ノ3片ハ5-6mm許、略シ同長デ平開シ、雄蕊ハ長2mm許アル。ひめなべわりニ於テハ4片共略シ同形、同長デ、長3-5mmアル。生品ヲ記載サレタ前川博士ニヨレバ“内〔花被〕片ハ廣橢圓形ナレドモ兩縁外卷スルヲ以テ長橢圓形ヲ呈シ”テ居リ(東亞植物圖説 II-3)、雄蕊ハ花被片ヨリ稍短イカ略シ同長デアル。MIQUELノ*Croomia japonica*ノ原文ニアル *anguste elliptico-oblonga*ト云フ記文ガなべわりデハナク九州産ノ形ニ一致スル事ハ以上ノ點カラウナヅケル事ト思フ。ソコデ私ハなべわりノ學名トシテ BAKERノ變種名ヲ引上ゲ ***Croomia heterosepala*** (BAKER) OKUYAMA, comb. nov. トスル事ヲ此處ニ提稱スル次第デアル。

Croomia japonica MIQUEL, Prol. Fl. Jap. p. 73 et 143 (1867); FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II. p. 93 (1877); KRAUSE in ENGL. Pflanzenfam. 2 Aufl. 15a p. 227 (1930).

Croomia kiusiana MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XVIII. p. 156 (1904); MAKINO et NEMOTO, Fl. Jap. p. 1287 (1925) ed. 2, p. 1529 (1931); MASAMUNE, Fl. Geobot. Yakusima p. 547 (1934); F. MAEKAWA in NAKAI'S Icon. Pl. As. Orient. II-3, p. 159. tab. XL. (1937); TERAZAKI, Nippon Syokubutu Zuhu, Suppl. 3693 (1938).

Nom. Jap. *Hime-nabewari*.

Hab. Hōnsyu (Aki, Nagato) et Kyusyu (Bungo, Hyuga, Hizen, Higo, Osumi).

Croomia heterosepala (BAKER) OKUYAMA, comb. nov.

Croomia japonica var. *heterosepala* BAKER in Journ. Bot. n. s. VI. p. 298 (1877); MATSUMURA, Ind. Pl. Jap. II. p. 187 (1912).

Croomia japonica (non MIQUEL) MAKINO in IINUMA, Somoku Dzusetsu ed. 3, I. p. 118 tab. 83 (1907); MAKINO et NEMOTO, Fl. Jap. p. 1287 (1925) ed. 2, p. 1529 (1931); TERAZAKI l. c. Suppl. 3692 (1938); MAKINO, Illust. Fl. Nipp. p. 762 fig. 2284 (1940).

Nom. Jap. *Nabe-wari*.

Hab. Hōnsyu (Sagami, Izu, Mikawa, Kawati, Izumi, Kii); Sikoku (Iyo, Tosa) et Kyusyu (Hizen).