

## 大井次三郎\* : 伊豆八丈島産タニウツギ属の新品

Jisaburo OHWI : *Weigela fragrans* Ohwi sp. nov.

from the Island of Hachijō in Idzu.

今年五月末に八丈島に採集を試みたが、その際には以前岡部正義氏が注意せられた様にハコネウツギと云はれて居る植物は眞のハコネウツギとは相違があるのを注意した。八丈島産のものはその外形はハコネウツギに酷く似て居るが、花に香りがあり花冠の長さが約 20 mm 位しかなく、花筒の上部は甚だ急に拡がり、腺体は長さ約 1 mm でハコネウツギの半分の長さであるので一応別種と認め、ニホヒウツギの和名と共に次の様に記載する。

***Weigela fragrans* Ohwi, sp. nov.**

Frutex 1-2 metralis, ramis robustiusculis cinereobrunneis, ramulis novellis 4-striatis, nodis et interdum in striis pubescentibus, foliis oppositis, petiolis 4-8 mm longis, supra sulcata margineque sparse pubescentibus, laminis ellipticis vel interdum oblongis utrinque abrupte attenuatis contractisve breve acuminatis serratis 8-12 cm longis 5-7 cm latis crassiusculis, supra praeter costas sparse pilosas glabris, subtus pallidiore subglabris vel in costis nervisque parcissime pilosis, pedunculis brevibus 3-5-floris axillaribus et terminalibus, bracteis subulatis fere glabris 5-8 mm longis, floribus fragrantibus, ovario lineari glabro, calycis segmentis subulatis subglabris 6-7 mm longis, corolla alba demum rubente 20 mm longa glabra, tubo ca. 6 mm longo intus pilosulo, limbo ab apice tubi abrupte ampliato 8-10 mm longo intus uno latere flavovirente, lobis 5 orbiculato-ovatis obtusissimis patentibus basi subcontractis, glandula 1 intus tubi inserta lutescente 1 mm longa extus sulcata, staminum filamentis liberis partibus glabris ca. 6 mm longis, antheris lineari-oblongis 4 mm longis infra medium dorso affixis, stylo tenui glabro 2 cm longo arcuato, stigmate discoideo 3-4 mm diam., capsula lineari-cylindrica basi acutiuscula, apice rostro recto ca. 6 mm longo terminata, sine rostro 17-23 mm longa. Differt a *W. coraeensi* Thunb. cui maxime affinis, floribus fragrantibus minoribus, glandulis duplo brevioribus.

Hab. Japonia : Ins. Hachijō in Idzu : Kashitatemura (Leg. J. Ohwi et N. Maruyama, May 31, 1949).

\* 国立科学博物館 National Science Museum, Tokyo.