

○日本植物斷片錄 (荒木英一) (2) Yeichi ARAKI : *Spicilegia florae Nipponiae*. (2)

(3) *Chrysosplenium Fauriae* Franch. var. *kiotoense* Ohwi forma *xanthandrum* Araki, f. nov.

[Kinshibe-botan-nekonome, Araki in *Yagai-Hakubutsu* 2-1: 10 (1940)]

A typo differt antheris flavis.

Nom. Nipp. Kinshibe-botan-nekonome (Araki, 1940).

Hab. Nipponia. Honshiu: prov. Tamba, Kitakuwada-gun, Kuroda-mura, Seriwo (Y. Araki, n. 6957); Amada-gun, mt. Yeboshi-yama (Y. Araki, n. 4547, 6728)—prov. Tajima, mt. Darugamine (Y. Araki, n. 6908-Typus).

(4) *Chrysosplenium viridescens* Suto forma *iodandrum* Araki, f. nov.

Chrysosplenium shiobarensense (non Franch., err. det.) Araki [in *Yagai-Hakubutsu* 2-1: 14 et 19, fig. 3 (1940)]

A typo differt antheris primo atrorubentibus mox nigropurpureis fine nigris.

Nom. Nipp. Kuro-nekonomeso (nom. nov.).

Hab. Nipponia. Honshiu: prov. Ohmi, mt. Watamukiyama (C. Hashimoto, n. 10679); mt. Hiyeizan (C. Hashimoto, n. 9285)—prov. Yamashiro, mt Kuramayama (Y. Araki, n. 4490, 4492); mt Otowa-yama in urbe Kioto (Y. Araki, n. 4491); mt. Atago-yama (Y. Araki, n. 7008)—prov. Tamba, Minamikuwadagun, Asahimura (Y. Araki, n. 4554); Shino-mura (Y. Araki, n. 7041); Funawi-gun, Nishihomme-mura (Y. Araki, n. 6002), Kamiwachi-mura (Y. Araki, n. 6844); Amadagun, mt. Muro-yama (Y. Araki, n. 4548, 4553-Typus, 4555); Hikami-gun, Miwa-mura (K. Adachi, 27, Jun. 1929); Taki-gun, Jionam-mura (S. Higuchi, 25, Apr. 1937)—prov. Tango, Kasagun, Kawahigashi-mura (Y. Araki, n. 4556, 4557, 6350)—prov. Tajima, mt. Darugamine (Y. Araki, n. 6910)—prov. Harima, Shiso-gun, Tominosu-mura (Y. Tatebe, 23, Mar. 1937).

(5) *Viola grypoceras* A. Gray var. *brevicalcarata* Araki, var. nov.

Calcar valde breve 3-4 mm longum 3 mm crassum sepalo multo brevius.

Nom. Nipp. Tamba-tachitsubosumire (nom. nov.).

Hab. Nipponia. Honshiu: prov. Tamba, Hikami-gun, Kadono-mura (Y. Araki, 10, Mai. 1931, n. 3728-Typus).

(6) *Viola mandshurica* W. Beck. var. *albescens* Nakai forma *pubescens*

Araki, f. nov. [in Yagai-Hakubutsu 3-1:13. (1941), nom. seminud. in textu.]

Petioli ciliolati et puberuli, pedunculi puberuli.

Nom. Nipp. Ke-koshirobanasumire (Araki, 1941).

Hab. Nipponia. Honshiu; prov. Tango, in pede mt. Awoba-yama-(Y. Araki, n. 6781-Typus).

(7) *Viola ovato-oblonga* Makino var. *luteo-viridiflora* (Araki) Araki, var. nov.

Viola ovato-oblonga Makino var. *pubescens* Nakai forma *luteo-viridiflora* Araki [in Yagai-Hakubutsu 3-1:16, (1941), nom. seminud. in textu.]

Calcar. brevissimum 1.5-2.5 mm longum 2.5 mm crassum. Flores viridiflavi. Cetera ut in var. *pubescens*.

Nom. Nipp. Asagi-kenagabanotachitsubosumire (Araki, 1941).

Hab. Nipponia, Honshiu: prov. Tamba, Hikami-gun, Kadono-mura (Y. Araki, n. 3998-a-Typus).

(3) **キンシベボタンネコノメ** ボタンネコノメの原産地山城：貴船には蒞紅色のものしか見當らないからそれを範型とし、蒞黄色のものをこの新品種にした。

(4) **クロネコノメサウ** サツマネコノメサウの範型は蒞が黄色であるから暗赤色より黒紫色を経て黒色となるものを新品種クロネコノメサウとした。近畿地方に普通に産するが、分布は更に廣いものであらう。因に同地方には範型は未知である。

(5) **タンバタチツボスミレ** タチツボスミレの距が極めて短いものを新變種タンバタチツボスミレと命名した。丹波の山野に稀に生じ花は4-5月に咲く。

(6) **ケシロバナスミレ** コシロバナスミレの葉柄と花梗に白色微毛を有する一品。

(7) **アサギケナガバナタチツボスミレ** ケナガバナタチツボスミレに似ているが距が極めて短く、花が帯緑黄色のもで、丹波に稀産する。