

22: in press. Jahns, H. M. 1970. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der Cladoniaceen unter besonderer Berücksichtigung des Podetien-Problems. *Nova Hedwigia* 20: 1-177. Wilson, F. R. M. 1890. A description of forty-one Victorian lichens new to science. *Victorian Naturalist* 6: 61-69. —, 1891. On lichens collected in the colony of Victoria, Australia. *Journ. Linn. Soc. London, Bot.* 28: 353-374. Yoshimura, I. & A. J. Sharp, 1968. A revision of genus *Gymnoderma*. *Amer. Journ. Bot.* 55(5): 635-640. Zahlbruckner, A. 1926. Lichenes. B. Spezieller Teil. In: A. Engler und K. Prantl (ed.), *Die natürlichen Pflanzenfamilien* 2 Ed., 8: 61-270. Leipzig.

* * * *

オーストラリア及びタスマニア産の *Neophyllis melacarpa* について研究した。極めて短小な子柄が基本葉体の先端から生じ、常に中実であることから *Neophyllis* 属はツブミゴケ属と同じであること、また基本葉体の背面と腹面に皮層があり、全体が極めて小さいことと、グレイアニン酸を含むことからツブミゴケ属のすでに知られた他の 3 種と違うので、ツブミゴケ属の独立種として移籍した。

また、ツブミゴケ属 4 種は腹面の皮層の有無で 2 つの節に分けられる。*Gymnoderma melacarpum* は北米の *G. lineare* とともに新たに *Neophyllis* 節に入れた。日本産の *G. insulare* はヒマラヤなどに分布する *G. coccocarpum* とともに *Gymnoderma* 節に属する。

なお、ツブミゴケ属の学名である *Gymnoderma* Nyl. (1863) は菌類の属 *Gymnoderma* Humb. ex Steud. (1824) と同名 (later homonym) であるが、菌類の *Gymnoderma* Humb. ex Steud. はすでに Donk が指摘したように正体不明の属で、発表されたあとだれも使用していないので、地衣類の属名の *Gymnoderma* Nyl. を保留することを提案中である。

正 誤 (Errata)

	頁 (Page)	行 (Line)	誤 (For)	正 (Read)
Vol. 48	235	7	48	46
	Pl. X	—	Mituii	Mitui
	Pl. XI	—	Mituii	Mitui