

Hiroyoshi OHASHI*: **Nomenclatural changes
in several Himalayan Leguminosae**

大橋広好*: ヒマラヤ産マメ科植物の学名の変更**

The present paper deals with nomenclatural changes of several taxa in eight genera of Leguminosae including corrections on my treatments in the second and third reports of the Flora of Eastern Himalaya (1971 & 1975).

1) **Shutteria involucrata** (Wall.) Wight et Arn., Prodr. 207 (1834)—Benth. in Miq., Pl. Jungh. 232 (1852)—Van Thuan in Adansonia ser. 2, 12: 298 (1972).

Glycine involucrata Wall., Pl. Asiat. Rar. 3: 33, t. 241 (1832).

var. **involucrata**.

Shutteria vestita Wight et Arn. var. *involucrata* (Wall.) Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 182 (1876)—Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 69 (1975).

S. sinensis Hemsl. in Hook., Icon. Pl. 27: t. 2626 (1900)—Craib, Fl. Siam. Enum. 1: 437 (1928).

Distr. Himalaya (Simla to Nepal), India, Burma, Thailand, Indo-China and China.

var. **glabrata** (Wight et Arn.) Ohashi, comb. nov.

Shutteria glabrata Wight et Arn., l. c. 207 (1834).

S. vestita Wight et Arn., l. c. 207 (1834)—Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 181 (1876)—Ohashi in Fl. E. Himal. 163 (1966); 3: 69 (1975)—Van Thuan in Adansonia ser. 2, 12: 295 (1972).

S. vestita var. *glabrata* (Wight et Arn.) Baker, l. c. 182 (1876).

Distr. Himalaya (Simla to Bhutan), India, Ceylon, Burma, Thailand, Indo-China, Malaysia and China.

f. **densiflora** (Benth.) Ohashi, stat. nov.

S. densiflora Benth. in Miq., Pl. Jungh. 232 (1852).

S. vestita var. *densiflora* (Benth.) Baker, l. c. 182 (1876)—Ohashi in Fl.

* Department of Botany, Faculty of Science, University of Tokyo, Hongo, Tokyo 113. 東京大学理学部植物学教室.

** 東京大学インド植物調査研究報告 No. 38.

E. Himal. 3: 69 (1975).

Distr. Himalaya (Gurwhal to Nepal).

var. **villosa** (Pamp.) Ohashi, comb. nov.

S. vestita var. *villosa* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 31 (1910).

S. pampaniniana Hand.-Mzt., Symb. Sin. 7: 579 (1933).

Distr. Yunnan.

2) **Chesneya nubigena** (D. Don) Ali in Scientist (Karachi) 3: 4 (1959).

Astragalus nubigenus D. Don, Prodr. Fl. Nep. 245 (1825)—Ohashi in Hara, Photo-Alb. Pl. E. Himal. f. 215 (1968); in Fl. E. Himal. 2: 62 (1971).

Astragalus crassicaulis Grah. in Wall., Cat. no. 5932 (1831-32), n. n.

Caragana crassicaulis Benth. ex Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 117 (1876).

Calophaca crassicaulis (Benth. ex Baker) Komarov in Acta Hort. Petrop. 29: 357 (1909).

Chesneya polystichoides (Hand.-Mzt.) Ali subsp. *bhutanica* Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 60, f. 10 (1975).

Distr. Himalaya (Kumaon to Bhutan), W. Tibet, Burma and China.

3) **Caragana jubata** (Pall.) Poir in Lam., Encycl. Méth. Suppl. 2: 89 (1811)—DC., Prodr. 2: 269 (1825)—Komarov in Acta Hort. Petrop. 29: 287 (1908)—Poyarkova in Fl. USSR. 11: 359 (1945).

Robinia jubata Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. 10: 370, t. 6 (1797).

Aspalathus jubatus (Pall.) O. Kuntze, Rev. Gen. 1: 161 (1891).

C. gerardiana Royle sensu Ohashi in Fl. E. Himal. 2: 63 (1971).

Distr. C. Asia, Himalaya, Tibet, Mongolia, China and Siberia.

4) **Vigna unguiculata** (L.) Walp., Rep. Bot. Syst. 1: 779 (1842)—Verdcourt in Kew Bull. 24: 542 (1970)—Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 71 (1975).

var. **catjang** (Burm. f.) Ohashi, comb. nov.

Dolichos catjang Burm. f., Fl. Ind. 161 (1768).

V. sinensis var. *catjang* (Burm. f.) Chiov. in Ann. Inst. Bot. Roma 8: 433 (1908)—T. Ito in Encycl. Jap. (Sanseido) 4: 804 (1910), ut var. *Catiang* (Burm.) T. Ito—Makino in Journ. Jap. Bot. 8: 18 (1932), ut var. *Catiang* (L.) Yatabe.

V. unguiculata var. *cylindrica* (L.) Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 71 (1975).

5) **Trigonella emodi** Benth. in Royle, Ill. Bot. Himal. 197 (1835)—Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 88 (1876)—Sirjaev in Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk no.

102, 19 (1928)—Kitamura, Fl. Afghan. 242 (1960)—Vassilc. in Fl. Syst. Pl. Vasc. 10: 158, f. 9 (1953)—Ali in Stewart, Annot. Cat. Pl. W. Pakistan & Kashmir 423 (1972).

subsp. **emodi**.

Distr. Afghanistan and Himalaya (Kashmir to Nepal).

subsp. **fimbriata** (Royle ex Benth.) Ohashi, stat. nov.

Trigonella fimbriata Royle ex Benth. in Royle, Ill. Bot. Himal. 197 (1835)
—Vassilc. l. c. 159 (1953)—Ali, l. c. 423 (1972).

T. emodi var. *fimbriata* (Royle ex Benth.) Sirjaev, l. c. 21 (1928).

T. corniculata L. sensu Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 88 (1876), p. p.

Distr. Himalaya (Kashmir to Nepal).

subsp. **medicaginoidea** (Sirjaev) Ohashi, stat. nov.

Botryolotus cachemirianus Jaub. et Spach., Illust. 1: 125 (1843).

Trigonella cachemiriana Camb. in Jacq., Voy. 4, Bot. 36, t. 41 (1844)—
Vassilc., l. c. 149 (1953)—Ali, l. c. 423 (1972).

T. emodi var. *medicaginoidea* Sirjaev, l. c. 20 (1928).

T. medicaginoidea (Sirjaev) Vassilc. in Not. Syst. 14: 163 (1951); in
Fl. Syst. Pl. Vasc. 10: 163 (1953)—Ali, l. c. 423 (1972).

Distr. Kashmir.

6) **Millettia extensa** (Benth.) Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 109 (1876)—Ali
in Stewart, Annot. Cat. Pl. W. Pakistan & Kashmir 413 (1972).

Robinia macrophylla Roxb., Fl. Ind. ed. 2, 3: 392 (1832), non *Millettia
macrophylla* Benth.

Otosema macrophylla Benth. in Miq., Pl. Jungh. 249 (1852).

O. extensa Benth., l. c. 249.

M. auriculata Baker ex Brandis, Forest Fl. Ind. 138 (1874)—Baker in
Fl. Brit. Ind. 2: 108 (1876)—Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 67 (1975).

7) **Albizia sherriffii** Baker f. in Journ. Bot. 1938: 20 (1938).

A. julibrissin Durazz. sensu Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 55 (1975), p. p.

Hab. Bhutan. Thargyal Mathur Bridge, 1500 m (2 June 1967, fl.).

Distr. Tibet and Bhutan.

8) **Cassia mimosoides** L., Sp. Pl. 379 (1753)—Benth. in Trans. Linn. Soc.
Bot. 27: 579 (1871)—De Wit in Webbia 11: 283 (1955)—Ohashi in Fl. E.
Himal. 142 (1966); 3: 59 (1975).

subsp. **mimosoides**.

- C. angustissima* Lam., Encycl. Méth. 650 (1783).
- C. wallichiana* DC. in Mém. Soc. Phys. Genève 2: 132 (1824); Prodr. 2: 504 (1825)—Wall., Cat. no. 5320 (1831-32).
- Senna sensitiva* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 353 (1832).
- S. tenella* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 354 (1832).
- C. telfairiana* Wall., Cat. no. 5324 (1831-32), n. n.
- C. myriophylla* Wall., Cat. no. 5326 (1831-32), n. n.
- C. mimosoides* var. *telfairiana* Hook. f. in Bot. Mag. t. 5874 (1870).
- C. mimosoides* var. *myriophylla* Benth. in Trans. Linn. Soc. Bot. 29: 579 (1871).
- subsp. **nomame** (Sieb.) Ohashi in Fl. E. Himal. 144 (1966).
- Distr. E. China, Manchuria, Korea and Japan.
- subsp. **lechenaultiana** (DC.) Ohashi, stat. nov.
- Cassia lechenaultiana* DC. in Mém. Soc. Phys. Genève 2: 132 (1824); Prodr. 2: 504 (1825)—De Wit in Webbia 11: 280 (1956)—Backer & Bakh. f., Fl. Java 1: 536 (1963)—Hatusima, Fl. Ryukyus 341 (1971).
- C. dimidiata* Buch.-Ham. [in Roxb., Hort. Beng. 32 (1814), n. n.] ex D. Don, Prodr. Fl. Nep. 247 (1825), e typo.
- Senna dimidiata* (Buch.-Ham. ex D. Don) Roxb., Fl. Ind. ed. 2, 2: 352 (1832).
- C. mimosoides* var. *aeschynomene* Benth. in Trans. Linn. Soc. Bot. 27: 579 (1871), p. p.
- C. mimosoides* var. *dimidiata* (Buch.-Ham. ex D. Don) Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 266 (1878).
- C. mimosoides* var. *wallichiana* Baker, l. c. 266 (1876)—Hand.-Mzt., Symb. Sin. 7: 541 (1933)—Kitamura in Fauna Fl. Nep. Himal. 164 (1955)—Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 59 (1975).
- Distr. India, Nepal, S. E. Asia, Malaysia (introduced), China, Formosa and Ryukyu.
- var. **auricoma** Benth. in Trans. Linn. Soc. Bot. 27: 580 (1871)—Baker in Fl. Brit. Ind. 2: 266 (1878).
- Cassia auricoma* (Benth.) Steyaert in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 20: 264 (1950).
- C. lechenaultiana* var. *auricoma* Grah. ex De Wit l. c. 282 (1955).
- Distr. India and Nepal.

* * * *

東部ヒマラヤの植物第2報(1971年), 第3報(1975年)に発表したマメ科植物の中で, 学名の訂正を必要とするものと, その後1975年4月から6月に British Museum (Natural History), Kew, Edinburgh および Paris の標本館でヒマラヤや中国のマメ科を研究した結果得られた新見解の一部とを併せて発表した。このうち日本にも分布するものはハタササゲ *Vigna unguiculata* (L.) Walp. var. *catjang* (Burm. f.) Ohashi, comb. nov. とタイワンカワラケツメイ *Cassia mimosoides* L. subsp. *lechenaultiana* (DC.) Ohashi, stat. nov. である。

熱帯に広く分布する *Cassia mimosoides* (狭義) とカワラケツメイの区別については東部ヒマラヤの植物第1報(1966年)で発表した。その後も *C. mimosoides* (広義) の変異に注意していたが, 小葉と花の大きさには相当の変異があり, 全分布域についてみると, 特にインドとヒマラヤの熱帯で著しいことが判った。小葉, 花および植物体の大きさについて一般的にいえば *C. mimosoides* (広義) の変異の幅の中で, カワラケツメイとタイワンカワラケツメイとはそれぞれ最小と最大の型である。

○高等植物分布資料(88) Materials for the distribution of vascular plants in Japan (88)

○アズマシクナゲ *Rhododendron metternichii* var. *pentamerum* Maxim. 岩手県胆沢郡胆沢町にアズマシクナゲの自生地が確認された。栗駒, 焼石国定公園のほぼ中央部の岩手県側に真湯温泉があるがその北側に海拔 900 m ほどの祭時山(マツルベヤマ)がある。この祭時山の頂は一関市に入るが山裾は東南部が一関市, 北西部が胆沢町若柳(旧若柳村)になり, この胆沢町分の一角に当る国有林内で自生群落を昭和50年6月21日に確認した。

アズマシクナゲは本州中北部に分布し, その南限は秩父山地, そして北限は宮城県栗原郡花山村と記録されており, 今回の確認は約 25 km 北上し新自生北限地となる。自生地は海拔 650 m ほどの傾斜面で, 約 20 a ほどに群生し, 高木では 3 m ほどのものもみられる。

(鈴木 実, 岩手県立六原農場)

○再び台湾産 *Drymaria* について (常谷幸雄) Yukio JOTANI: Supplement notes on *Drymaria* from Taiwan

著者はさきに本誌第48巻第3号に, 台湾の各地に *Drymaria cordata* Willdenow var. *pacifica* Mizushima に当るものが産すること, 同時に同属のもので葉の幅が 25.0 mm をこえるもの, 茎に腺毛があるもの, 花柄に腺毛が多いもの, 萼片に腺毛が見られるものなどがあることを報じた。その後1973年7月に奄美徳之島及び沖縄本島で同属のものを採集し, 台湾産のものを含めて栽培して比較観察したところ, 台湾産