



Fig. 4. *Cordyceps virens*. A. Stroma, $\times 1.6$. B. Perithecia, $\times 62$. C. Asci. D. Peridial layer of head. E. Peridium of stalk. F. Inner tissue of stalk.

Stromata capitata. Pars fertilis globosa, 1.8-2 mm diam., atrata, minute mammillata. Stipites elongato-cylindrici, 90 mm longi, 0.8 mm crassi, obscure virentes, textu e peridiis pseudoparenchymatico et medullis hyphis contexto. Perithecia ovoidea, penitus immersa, $400 \times 250 \mu$. Asci 3.5μ crassi, capitibus $3.0-3.5 \mu$ diam.. Articuli ascosporarum $6 \times 1.5 \mu$, utrinque truncati.

Hab. On *Elaphomyces* sp., Kawarayu Spa, Gunma Prefecture, Japan, S. Uchiyama, July 30, 1979—Type in TNS.

* * * *

4新種のうち *Verpa formosana* と *Cordyceps bokyoensis* は昨年秋に行われた日台合同菌類調査中に玉山麓で採集されたものである。*Cordyceps rubrostromata* と *C. virens* とは群馬県の川原湯で採集された。

□山田卓三(監修): ピッツェッティ・マリエッラ, 西洋野菜の百科 255 pp. 1983. 万有ガイド・シリーズ19, 小学館, 東京. ¥1,700. 西洋野菜45種, 香辛植物7種, 果実20種について美しい挿絵を加え, 故事来歴や栽培法, 品種, それに1-2の料理法を添えた本で, さらりと書いてあって楽しい。日本に入ってからのも割に詳しくでている。サツマイモやナシなどは大部分抜いてあるのもやむを得ないだろう。日本には驚くほど外国系統の野菜, 果樹が入っており, 近年は香辛料としての外国産が多くなったので, それ向きには便利な本といえよう。最後にこれらを使った田所しづ子氏の和風料理がついているのも, 存外便利というものである。(前川文夫)