

○ホシダの新品種 (志村義雄) Yoshio SHIMURA: A new form of *Cyclosorus acuminatus*

このシダは名倉智道氏が1980年9月23日、静岡県三ヶ日町平山の寺付近の路傍の斜面で発見された。その群落は約1 m²、ソーラスを着けた葉は全然見当らなかった。そこで同氏宅に移植栽培された結果、ソーラスを着けた葉が多数生じた。筆者もまた移植栽培したところ、名倉氏と同一結果であった。このシダはホシダの一型と考えられ、その特徴は、葉が50 cm まで、羽片が短かく5 cm まで、線形、基部が耳状ではこ形、縁は波状形又はほとんど全縁。上部の羽片は短縮し、楕円形～円形で次第に小さくなり、著しい頂羽片となり、仏塔の九輪に似る。胞子は定形で、ホシダと同形である。和名をクリンホシダと新称する。

Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai ex H. Ito in Bot. Mag. Tokyo 51: 710, 1937.

forma **nagurae** Shimura, f. nov.

A typo differt, pinnis breviter linearibus basi auricularihastatis margine fere integris, pinnis superioribus sibito reductis ellipticus vel rotundis, gradatim deminutis, demum confluentibus.

Hab. Hirayama, Mikikabicho, Shizuoka Pref. (leg. Toshimichi Nagura, Sept. 23, 1980—Holotype in TNS). (静岡市)



図 1. クリンホシダ *Cyclosorus acuminatus* f. *nagurae* (holotype).