

above (all from Szechuan Province).

* * * *

1) *Frullania changii* の種小名は採集者の一人張光初博士に因む。タイプ標本は 1 点でしかもステリルであったが、アジア産同亜属内でこれに似た種は *F. hasskarliana* しか無い。後者は熱帯アジアに分布し、葉上片が長く、卵形〜だ円形で頂端が尖り、腹葉も通例長く、両側がよく反曲する。

2) *F. duthiana* var. *szechuanensis* は var. *duthiana* よりも大形（植物体のみならず、葉、腹葉なども）で、花被も大きく、単に 3 褶（小形の 2 次褶無し）である。Var. *duthiana* は西北インドからヒマラヤを通じてブータンに知られている。

○ネパール植物誌ヒユ科の追加 (J. M. ムラン) J. Michael MULLIN: Some additions to Amaranthaceae of Nepal

1) The return of some material to British Museum after a long period on loan has shown that a further genus should be added to the account of Amaranthaceae in Hara et al., Enumeration of the flowering plants of Nepal Vol. 3 (1982).

BOSEA L.

Bosea amherstiana (Moquin) Hook. f. in Fl. Br. Ind. 4: 716 (1885).

Deeringia amherstiana Wall., Cat. 231, n. 6889 (1832), nom. nud.

Rodetia amherstiana Moquin in DC., Prodr. 13(2): 323 (1849).

West: *Bis Ram* 445. 1200-2100 m.

W. Himalaya (Kashmir to Nepal).

2) Dr. A. Kanis has recently determined as *Alternanthera paronychioides* St. Hil. a specimen in BM formerly named *A. sessilis* (L.) DC. *A. paronychioides* is a species native to tropical America occasionally recorded in the Old World, presumably as an introduction. It differs from *A. sessilis* in having five not three stamens and oblong not ovate sepals.

Alternanthera paronychioides St. Hil., Voy. Brésil 2: 439 (1833), "*paronychioides*". Pedersen in Darwiniana 14(2-3): 427 (1967).

Cent.: *Codrington* 259. 2160 m,

Tropical America, a rare introduction in Old World tropics.

ネパール産ヒユ科植物に上記 2 種を追加した。

(Department of Botany, British Museum (Natural History), London)