

shirakawa-gun, Nanko (N. Satomi, Jul. 9, 1950, TI). Tochigi Pref. :Nasu, Kobukabori, Shitsugen (H. Hara, Sept. 1, 1957, TI). Gunma Pref. : Kanra-gun, Shimonida-cho, Kouzu-bokuzyo (T. Satomi, Sept. 25, 1960, TI). Nagano Pref. :Asama (C. Owatari, 1894, Holotype, TI);Miyoda (C. Owatari, Aug. 12, 1894, Paratype, TI); Karuizawa, Minami-karuizawa (H. Hara, Oct. 1, 1945, TI); Yatsugatake, Nobeyama-Akadake (K. Sato, Aug. 5, 1961, no. 3048, TI); Matsubarako (S. Ito, Sept. 1919, no. 42, MAK); Suwagun, Hara-mura (Z. Sato, Aug. 26, 1983, TI); Kirigamine, Kurumayama, 1750, (M. Togashi, Sept. 1, 1967, TI); Higashi-chikumagun, Katadate-mura (H. Kubota, Sept. 9, 1949, TNS). Yamanashi Pref. :Kita-komagun, Ohizumi (Y. Naoe, Sept. 8, 1969, TNS); Kitakoma-gun, Kiyosato, Utsukushimori-yama 1300m (J. Murata, Aug. 10, 1975, no. 606, TI). Shiga Pref. : Ika-gun, Nishi-asai-mura,

Ohura (H. Katsumata, Aug. 1918, MAK).

牧野日本植物図鑑の増訂補遺の誤りにふれたが、ついでにもうひとつ誤りを指摘しておこう。イチゲフウロの学名が *G. sibiricum* var. *glabrium* となっていることである。これは前の版では変種名が付いていなかったのに、変種名を加えたものである。変種にする必要は無いと思うがここでは論議しない。間違いは var. *glabrium* としたことである。原氏は *G. sibiricum* f. *glabrius* として書いたもので、大井氏がこれを変種に変更した際も var. *glabrius* (Hara) Ohwi としている。 *Geranium* なので *glabrium* としてしまったのであろうが、*glabrium* という言葉は存在しない。増訂補遺は短時間で作られたので、こうした誤りが出るのだと思う。ほかにも少しだが誤りがみうけられる。もっと時間をかけてじっくり改定できる環境であったらと残念に思う。

(東京大学理学部附属植物園)

Abdur RASHID<sup>a, b</sup> and Hideaki OHBA<sup>a</sup>: *Cardamine sinica*, A New Name for *Cardamine heterophylla* Cheo et Fang (Cruciferae)

*Cardamine heterophylla* Cheo et Fang の新学名 (A. ラシッド・大場秀章)

Cheo and Fang (1980) described *Cardamine heterophylla* from China. This is a later homonym of *C. heterophylla* (G. Forst.) O.E.Schulz from New Zealand published in Bot. Jahrb. 32:487 (1903).

The species described by Cheo and Fang (1980) is distinguished from *C. heterophylla* (G. Forst.) O. E. Schulz by the tri- or quinquefoliate radical leaves, the approximately 12 cauline leaves, the always quinquefoliate basal, the trifoliate middle leaves and simple upper leaves. It is clear that the species is distinctly different from *C. heterophylla* (G. Forst.) O. E. Schulz in morphological characters and distribution.

This Chinese species resembles *C. hygrophylla*, *C. anhuiensis* and *C. tanakae* in having suborbicular leaflets with irregular obtuse, dentate margins and

divergent venation and makes a natural group together with these species.

*Cardamine sinica* Rashid et H. Ohba, nom. nov.

*Cardamine heterophylla* Cheo et Fang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 6:27 (1980); Cheo, Fl. Reipubl. Pop. Sin. 33:206 (1987). Type: Sichuan Sheng: Nanchuan Xian, Daheba, (K.L. Chu 6034 on 13 July, 1938-HN, not seen).

周太炎と方瑞征が(中国四川省から)、記載した *Cardamine heterophylla* はマルバコンロンソウや中国の四川・広西省の *C. hygrophylla*, 安徽省の *C. anhuiensis* に近縁な1種である。残念ながら先行名があり使用できないので、*C. sinica* なる新名を提唱した。

(<sup>a</sup>東京大学総合研究資料館,  
<sup>b</sup>ペシャワール大学植物学部)